

Si has nacido entre los años

2001 y 2003

salud pública

**VACÚNATE**

frente a

**MENINGOCOCO  
A, C, W, Y**



¡DALE UN LIKE A TU SALUD!




Castilla-La Mancha

## ¿Qué es la meningitis meningocócica?

La meningitis meningocócica se produce tras la infección causada por una bacteria, el meningococo. Se caracteriza por la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal (meninges). Se puede manifestar con fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, rigidez de nuca y disminución del nivel de conciencia.

El meningococo puede llegar a la sangre y penetrar en el organismo desde el foco de infección, causando meningitis, neumonía u otras infecciones de órganos (enfermedad meningocócica invasiva).

La infección por sí sola no suele producir enfermedad. Algunas personas transportan estas bacterias en las fosas nasales y faringe sin padecer enfermedad (estado de portador asintomático), pero pueden contagiar a otras personas que sí podrían desarrollar la enfermedad.



## ¿Cómo se contagia?

Las bacterias causantes se transmiten de persona a persona mediante gotitas o aerosoles expulsados desde las vías respiratorias al toser o estornudar, tras un contacto prolongado con personas enfermas o con portadores asintomáticos.


## ¿Qué variantes presenta el meningococo?

Esta familia de bacterias puede tener hasta 12 variantes diferentes (serogrupos) en función de su composición. Cada serogrupo se denomina con una letra. Los más frecuentes son el A, B, C, W, X e Y.

En los últimos años se ha detectado en España un aumento de los casos producidos por los serogrupos W e Y. Entre los jóvenes y adolescentes se encuentra el mayor número de portadores asintomáticos, que no padecen la enfermedad pero pueden transmitirla a los demás.

## ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad?

La mejor medida preventiva para hacer frente a la meningitis por meningococo de los serogrupos A, C, W e Y es la vacunación. La vacuna tetravalente conjugada frente al meningococo proporciona a cada persona vacunada protección individual directa. También actúa sobre las bacterias que existen en la nasofaringe, disminuyendo el número de portadores asintomáticos. Al dificultar la circulación de la bacteria, se reduce la posibilidad de transmitir la enfermedad y se protege al resto de personas (inmunidad colectiva o de grupo).



# VACÚNATE

Frente a MENINGOCOCO A, C, W, Y

## ¿Qué estrategia de vacunación se va a adoptar?

Teniendo en cuenta la forma en que se transmite la enfermedad y el aumento de casos producidos por serogrupos W e Y, en el calendario oficial de vacunaciones infantiles se sustituye la dosis de vacuna frente a meningococo C que se administra a los 12 años de edad por vacuna tetravalente frente a meningococo A, C, W e Y.



**En 2020:** Se ofertará la vacunación a los nacidos y nacidas entre 2001 y 2003.



**En 2021:** Se ofertará la vacunación a los nacidos y nacidas en 2004 y 2005.



**En 2022:** Se ofertará la vacunación a los nacidos y nacidas en 2006 y 2007.

Además, se administrará una dosis de vacuna tetravalente a las chicas y chicos nacidos entre 2001 y 2007, durante un periodo de tres años:

		AÑO DE NACIMIENTO											
AÑO DE ADMINISTRACIÓN	2020	2001	2002	2003						2008			
	2021				2004	2005				2009			
	2022							2006	2007			2010	
	2023												2011
		Vacunación de rescate							Vacunación calendario 12 años				



# Calendario de Vacunaciones Infantiles

## EN CASTILLA-LA MANCHA



<sup>1</sup> Los nacidos a partir del 1 de enero de 2015 que fueron vacunados frente a varicela a los 15 meses, recibirán la segunda dosis al cumplir 4 años de edad.

<sup>2</sup> Los nacidos a partir de 1 de enero de 2017 recibirán la vacuna combinada de alta carga al cumplir 6 años de edad.

<sup>3</sup> Dos dosis. Sólo para niños y niñas que a los 12 años no hayan pasado la enfermedad y/o recibido ninguna dosis previamente.

<sup>4</sup> Los que hayan recibido una única dosis de vacuna antes de los 12 años, completarán la pauta con otra dosis a esta edad.

<sup>5</sup> Sólo chicas. Dos dosis pauta 0-6 meses.

# VACÚNATE

Frente a MENINGOCOCO A, C, W, Y

## ¿Cómo se administra la vacuna?

En jóvenes y adultos se administra por vía intramuscular, en la parte superior del brazo.

## ¿Es necesario administrar dosis de refuerzo?

Actualmente no está indicada una dosis de refuerzo. Solo en algunos casos especiales, como las personas con inmunodepresión, podría ser necesaria.

## ¿Cuándo está contraindicada la vacuna?

No se deben vacunar aquellas personas que hayan presentado hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna.




## ¿Qué hay que hacer para vacunarse?

Tu centro de salud o consultorio local organizará la citación e indicará los días y horarios programados para proceder a la vacunación. En caso de tener aseguramiento privado, consulta a tu compañía de asistencia sanitaria.



## ¿Cuáles son las reacciones adversas a la vacunación?

Tras la administración de la vacuna pueden aparecer reacciones leves en el punto de inyección como dolor, enrojecimiento y picor. Otras reacciones pueden ser irritabilidad, pérdida de apetito, cefalea, náuseas, fiebre o malestar general. Las reacciones graves son muy poco frecuentes.



**VACÚNATE**  
frente a  
**MENINGOCOCO**  
**A, C, W, Y**



Castilla-La Mancha