

[Inicio](#) > [Ciudadanos](#) > Preguntas más frecuentes

---

[¿Necesita prescripción facultativa o consentimiento informado?](#) [1]

No es preciso, al igual que las vacunas de calendario.

[¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes?](#) [2]

La reacción adversa más frecuente es la erupción (0,7 %) que se produce en los 14 días posteriores a la dosis. La mayoría de los casos son de intensidad leve a moderada.

Además, puede aparecer fiebre y reacción en el lugar de la inyección en un 0,6 % y un 0,4 % respectivamente, dentro de los 7 días posteriores a la dosis. Las reacciones en el lugar de la inyección no fueron graves.

[¿Cuándo está contraindicado?](#) [3]

Como cualquier fármaco, se contraindica si existe hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes (L-histidina, hidrocloreto de L-histidina, hidrocloreto de L-arginina, sacarosa, polisorbato 80).

## Páginas

- [primera](#) [4]
- [<](#) [5]
- [1](#) [4]
- [2](#) [5]
- [3](#)

---

**Source URL:** <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes/Virus%20Respiratorio%20Sincitial?page=2>

### Links

[1] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/necesita-prescripcion-facultativa-o-consentimiento-informado>

[2] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuales-son-las-reacciones-adversas-mas-frecuentes>

[3] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuando-esta-contraindicado>

[4] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes/Virus%20Respiratorio%20Sincitial>

[5] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes/Virus%20Respiratorio%20Sincitial?page=1>