¿Necesita prescripción facultativa o consentimiento informado? [1]

No es preciso, al igual que las vacunas de calendario.

¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? [2]

La reacción adversa más frecuente es la erupción (0,7 %) que se produce en los 14 días posteriores a la dosis. La mayoría de los casos son de intensidad leve a moderada.

Además, puede aparecer fiebre y reacción en el lugar de la inyección en un 0,6 % y un 0,4 % respectivamente, dentro de los 7 días posteriores a la dosis. Las reacciones en el lugar de la inyección no fueron graves.

¿Cuándo está contraindicado? [3]

Como cualquier fármaco, se contraindica si existe hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes (L-histidina, hidrocloruro de L-histidina, hidrocloruro de L-arginina, sacarosa, polisorbato 80).

Páginas

- primera [4]
- ‹ [5]
- 1 [4]
- 2 [5]
- 3

Source URL: https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes/Virus%20Respiratorio%20Sincitial?page=2

Links
[1] https://sanidad.castillalamancha.es/content/necesita-prescripcion-facultativa-o-consentimiento-informado
[2] https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuales-son-las-reacciones-adversas-mas-frecuentes
[3] https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuando-esta-contraindicado
[4] https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes/Virus%20Respiratorio%20Sincitial
[5] https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes/Virus%20Respiratorio%20Sincitial?page=1