

[Inicio](#) > [Ciudadanos](#) > Preguntas más frecuentes

[¿Cómo se produce la infección en el hombre? \[1\]](#)

Para que se desarrolle la enfermedad es preciso que:

- La bacteria entre en la instalación.
- Se multiplique en ella.
- Se disperse en forma de aerosoles.
- Sea una cepa virulenta para el hombre.
- Estén expuestos individuos susceptibles.

[¿Quiénes son susceptibles de desarrollar la enfermedad? \[2\]](#)

Las personas de todas las edades son susceptibles de ser infectadas pero principalmente afecta a personas mayores de 50 años. Los hombres son tres veces más susceptibles de contraer la enfermedad que las mujeres.

Su desarrollo va a depender de los factores de riesgo que incrementan las posibilidades de contraer la enfermedad y que, además, complican el pronóstico y dificultan el tratamiento como son el ser **fumador**, **diabético**, **tener edad avanzada** o **problemas respiratorios**, así como personas con **bajas defensas** como pacientes trasplantados o en tratamiento con corticosteroides.

[¿Cuál es el período de incubación? \[3\]](#)

El período de incubación puede variar **de 2 a 14 días**, con una media de 6 a 7 días después de la exposición. En algunos brotes (Holanda, Portugal) se han observado casos con periodos de incubación de 19 días.

[¿Cuál es el tratamiento? \[4\]](#)

Hay antibióticos específicos que son eficaces en el tratamiento de la enfermedad.

[¿Cómo se diagnostica? \[5\]](#)

Un diagnóstico rápido puede hacerse mediante pruebas de una muestra de orina del paciente, una vez que se han producido los síntomas de la enfermedad.

[¿Qué debo hacer si creo que tengo legionelosis? \[6\]](#)

Si usted cree que tiene esta infección, debe informar a su médico para que confirme si usted padece la enfermedad y en caso afirmativo ponerle el tratamiento correspondiente.

[¿Cómo se previene la legionelosis? \[7\]](#)

Hay regulaciones estrictas para asegurar que los sistemas de agua utilizados para la refrigeración por aire o para su uso en centros comerciales, turísticos y otros edificios se mantengan con las condiciones que minimicen el riesgo de la enfermedad y no alberguen la bacteria que causa la legionelosis.

[¿Puede ser grave y frecuente esta enfermedad? \[8\]](#)

La legionelosis es una enfermedad poco común pero grave y puede desencadenar la muerte en aproximadamente el 10 y el 15 por ciento de los individuos sanos. El número de muertes puede ser mayor en algunos grupos de pacientes como los fumadores, diabéticos, personas con edad avanzada o con problemas respiratorios y los que tienen el sistema inmune debilitado.

[¿Qué investigaciones se llevan a cabo sobre la legionelosis? \[9\]](#)

Los Departamentos de Salud Pública recogen información a nivel local y nacional en todos los casos declarados. Se estudian tendencias o patrones de enfermedades que pueden mostrar grupos de casos vinculados a un área de residencia o lugar de trabajo. Si se detecta un brote, los sanitarios de salud ambiental ayudan a identificar la fuente de infección y controlar el brote.

[¿Es una enfermedad presente en todo el mundo? \[10\]](#)

Se han declarado casos de todos los países industrializados y en los últimos años están aumentando en la mayoría de los países. Cada año se declaran unos 5.000 casos la Unión Europea (UE).

Páginas

- [primera](#) [11]
- [◀](#) [12]
- ...
- [21](#) [13]
- [22](#) [14]
- [23](#) [15]
- [24](#) [12]
- 25
- [26](#) [16]
- [27](#) [17]
- [28](#) [18]
- [29](#) [19]
- ...
- [▶](#) [16]
- [última](#) [20]

Source URL: <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=24>

Links

- [1] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-produce-la-infeccion-en-el-hombre>
- [2] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/quienes-son-susceptibles-de-desarrollar-la-enfermedad>
- [3] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cual-es-el-periodo-de-incubacion>
- [4] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cual-es-el-tratamiento>
- [5] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-diagnostica>
- [6] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/que-debo-hacer-si-creo-que-tengo-legionelosis>
- [7] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-previene-la-legionelosis>
- [8] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/puede-ser-grave-y-frecuente-esta-enfermedad>
- [9] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/que-investigaciones-se-llevan-cabo-sobre-la-legionelosis>
- [10] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/es-una-enfermedad-presente-en-todo-el-mundo>
- [11] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes>
- [12] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=23>
- [13] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=20>
- [14] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=21>
- [15] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=22>
- [16] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=25>
- [17] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=26>
- [18] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=27>
- [19] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=28>
- [20] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/preguntasfrecuentes?page=35>