

[Inicio](#) >

Incapacidad Temporal

[¿Cuánto dura como máximo la incapacidad temporal?](#) [1]

En la actualidad, el **plazo máximo de duración de la incapacidad temporal es de 365 días**, transcurridos los cuales el médico responsable da por finalizado su seguimiento, siendo el INSS el único organismo gestor de la incapacidad temporal desde ese momento. La situación se formaliza mediante la emisión del documento “alta por control INSS”.

Agotado ese plazo, el trabajador será examinado por el INSS que podrá:

- a. Prorrogar la baja 180 días más (hasta 545 días), sólo cuando se presume que el paciente podría recuperarse en este período. A esta situación se le denomina “demora de calificación”.
- b. Iniciar un expediente de incapacidad permanente.
- c. Emitir el alta médica.

En cualquier caso, la continuidad asistencial de cuidados sanitarios seguirá siendo responsabilidad del Sistema Nacional de Salud (SESCAM), independientemente de la situación de incapacidad temporal.

REFERENCIA NORMATIVA: Art. 169 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre)

En el siguiente gráfico se explica el procedimiento establecido para aquellos casos en los que el/la paciente cumple 365 días en situación de baja laboral, momento a partir del cual el control de la baja pasa a ser realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

□ [2]

Legionela

[¿Qué es la legionelosis?](#) [3]

La legionelosis es una neumonía grave causada por la bacteria *Legionella*. Fue identificada por primera vez en 1976 tras el estudio de un brote de neumonía en Filadelfia.

El término genérico de legionelosis se utiliza para describir las distintas formas de presentación de la enfermedad:

La enfermedad puede presentarse en forma de casos esporádicos u originar brotes de distinta magnitud dependiendo de la fuente de infección.

[¿Dónde se encuentra la bacteria legionela?](#) [4]

Las bacterias están ampliamente distribuidas en el medio ambiente y se han encontrado en el agua de lluvia, lagos y ríos. El problema surge cuando se contaminan los sistemas que utilizan agua para su funcionamiento.

[¿Cuáles son las fuentes de infección?](#) [5]

Las fuentes potenciales de infección incluyen cualquier equipamiento que pueda producir **aerosoles**.

Los brotes producidos por torres de refrigeración son los que mayor impacto tienen en la población debido a la gran dispersión que pueden tener los aerosoles que producen, así como sistemas de agua caliente, balnearios (spas, duchas, ...), nebulizadores y fuentes ornamentales.

Otros brotes se restringen a establecimientos y lugares cerrados como hospitales, hoteles, barcos, etc.

La enfermedad tiene una presentación estacional y los casos se producen con mayor frecuencia a finales de verano y en otoño.

[¿Cuáles son los síntomas?](#) [6]

Dolores musculares, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de apetito, tos seca y fiebre, lo que lleva a la neumonía. A veces

se produce diarrea y los pacientes pueden sufrir confusión.

[¿Cómo se transmite? \[7\]](#)

Por inhalación de pequeños aerosoles que contienen la bacteria.

La infección NO se contagia de una persona a otra. La enfermedad se transmite por inhalación de aerosoles (pequeñas gotas de agua que se evaporan muy rápidamente) de un sistema de agua contaminada.

No se transmite:

- De persona a persona.
- Ni bebiendo agua contaminada por la bacteria.

[¿Cómo se produce la infección en el hombre? \[8\]](#)

Para que se desarrolle la enfermedad es preciso que:

- La bacteria entre en la instalación.
- Se multiplique en ella.
- Se disperse en forma de aerosoles.
- Sea una cepa virulenta para el hombre.
- Estén expuestos individuos susceptibles.

[¿Quiénes son susceptibles de desarrollar la enfermedad? \[9\]](#)

Las personas de todas las edades son susceptibles de ser infectadas pero principalmente afecta a personas mayores de 50 años. Los hombres son tres veces más susceptibles de contraer la enfermedad que las mujeres.

Su desarrollo va a depender de los factores de riesgo que incrementan las posibilidades de contraer la enfermedad y que, además, complican el pronóstico y dificultan el tratamiento como son el ser **fumador, diabético, tener edad avanzada o problemas respiratorios**, así como personas con **bajas defensas** como pacientes trasplantados o en tratamiento con corticosteroides.

[¿Cuál es el período de incubación? \[10\]](#)

El período de incubación puede variar **de 2 a 14 días**, con una media de 6 a 7 días después de la exposición. En algunos brotes (Holanda, Portugal) se han observado casos con periodos de incubación de 19 días.

[¿Cuál es el tratamiento? \[11\]](#)

Hay antibióticos específicos que son eficaces en el tratamiento de la enfermedad.

Páginas

- [primera](#) [12]
- [1](#) [13]
- ...
- [24](#) [14]
- [25](#) [15]
- [26](#) [16]
- [27](#) [13]
- 28
- [29](#) [17]
- [30](#) [18]
- [31](#) [19]
- [32](#) [20]
- ...
- [2](#) [17]
- [última](#) [21]

Source URL: <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=27>

Links

- [1] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuanto-dura-como-maximo-la-incapacidad-temporal>
- [2] https://sanidad.castillalamancha.es/files/imagenes_galerias/it-9.png
- [3] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/que-es-la-legionelosis>
- [4] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/donde-se-encuentra-la-bacteria-legionela>
- [5] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuales-son-las-fuentes-de-infeccion>
- [6] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuales-son-los-sintomas>

- [7] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-transmite>
- [8] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-produce-la-infeccion-en-el-hombre>
- [9] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/quienes-son-susceptibles-de-desarrollar-la-enfermedad>
- [10] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cual-es-el-periodo-de-incubacion>
- [11] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cual-es-el-tratamiento>
- [12] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs>
- [13] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=26>
- [14] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=23>
- [15] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=24>
- [16] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=25>
- [17] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=28>
- [18] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=29>
- [19] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=30>
- [20] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=31>
- [21] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=39>