

[Inicio](#) >

Virus Respiratorio Sincitial

[¿Dónde se inmunizará a los menores?](#) [1]

La inmunización frente al virus respiratorio sincitial se llevará a cabo:

- - - Desde los centros hospitalarios durante las primeras 24/48 horas de vida del menor.
 - Desde los centros de salud y consultorios locales de Atención Primaria a través de captación activa por parte del personal de Pediatría.

[¿Cuándo se administrará este anticuerpo?](#) [2]

Este fármaco se administrará a partir del mes de octubre de 2023 y dependerá del grupo de edad al que pertenezca el lactante.

[¿Qué patologías de riesgo en menores de dos años tienen indicación?](#) [3]

1. Cardiopatías congénitas con afectación hemodinámica significativa, cianosantes o no cianosantes.
2. Displasia broncopulmonar.
3. Inmunodepresión grave: enfermedades oncohematológicas; inmunodeficiencias primarias, especialmente combinadas y agammaglobulinemia congénita. Tratamiento con inmunosupresores de forma continuada.
4. Errores congénitos del metabolismo.
5. Enfermedades neuromusculares.
6. Enfermedades pulmonares graves.
7. Síndromes genéticos con problemas respiratorios relevantes.
8. Síndrome de Down.
9. Fibrosis quística.
10. En cuidados paliativos.

[¿Se puede administrar este anticuerpo coincidiendo con la administración de una dosis del calendario vacunal en una de las revisiones del lactante?](#) [4]

Sí, se puede administrar conjuntamente con vacunas del calendario en lugares anatómicos diferentes, en este caso en la zona exterior del muslo (vasto externo) separadas unos 2,5 cm.

[¿Cuántas dosis serán necesarias?](#) [5]

En todos los casos en los que esté indicado este medicamento es suficiente con la administración de una sola dosis para la temporada de otoño-invierno 2023/2024.

[¿Este medicamento estará disponible en farmacias?](#) [6]

Para la campaña 2023-2024 este fármaco no estará disponible en farmacias.

[¿Necesita prescripción facultativa o consentimiento informado?](#) [7]

No es preciso, al igual que las vacunas de calendario.

[¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes?](#) [8]

La reacción adversa más frecuente es la erupción (0,7 %) que se produce en los 14 días posteriores a la dosis. La mayoría de los casos son de intensidad leve a moderada.

Además, puede aparecer fiebre y reacción en el lugar de la inyección en un 0,6 % y un 0,4 % respectivamente, dentro de los 7 días posteriores a la dosis. Las reacciones en el lugar de la inyección no fueron graves.

[¿Cuándo está contraindicado?](#) [9]

Como cualquier fármaco, se contraindica si existe hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes (L-

histidina, hidrocloreuro de L-histidina, hidrocloreuro de L-arginina, sacarosa, polisorbato 80).

Páginas

- [primera](#) [10]
- [1](#) [11]
- ...
- [37](#) [12]
- [38](#) [13]
- [39](#) [14]
- [40](#) [15]
- [41](#) [16]
- [42](#) [17]
- [43](#) [18]
- [44](#) [11]
- 45

Source URL: <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=44>

Links

- [1] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/donde-se-inmunizara-los-menores>
- [2] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuando-se-administrara-este-anticuerpo>
- [3] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/que-patologias-de-riesgo-en-menores-de-dos-anos-tienen-indicacion>
- [4] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/se-puede-administrar-este-anticuerpo-coincidiendo-con-la-administracion-de-una-dosis-del>
- [5] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuantas-dosis-seran-necesarias>
- [6] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/este-medicamento-estara-disponible-en-farmacias>
- [7] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/necesita-prescripcion-facultativa-o-consentimiento-informado>
- [8] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuales-son-las-reacciones-adversas-mas-frecuentes>
- [9] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/cuando-esta-contraindicado>
- [10] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs>
- [11] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=43>
- [12] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=36>
- [13] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=37>
- [14] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=38>
- [15] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=39>
- [16] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=40>
- [17] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=41>
- [18] <https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/programas-deteccion-precoz/faqs?page=42>