

## [Medidas de prevención](#) [1]

Jue, 22/08/2019 - 14:19 -- aaor10

Para evitar contraer la infección, se recomiendan unas pautas sencillas:

Idioma Undefined

- [Leer más sobre Medidas de prevención](#) [1]

## [¿Qué hacer tras la ingesta de un alimento que pueda estar contaminado por listeria?](#) [2]

Jue, 22/08/2019 - 14:18 -- aaor10

Debe acudir a un centro sanitario y comunicar al personal que le atienda sobre la posibilidad de que haya ingerido alimentos contaminados, además de los síntomas que presenta como pueden ser fiebre, diarrea, fatiga y/o dolores musculares, dentro de los dos meses de haber consumido dichos alimentos.

Esto es especialmente importante si se trata de una mujer embarazada, un recién nacido/nacida, personas mayores o que tienen el sistema inmunitario debilitado.

Idioma Undefined

- [Leer más sobre ¿Qué hacer tras la ingesta de un alimento que pueda estar contaminado por listeria?](#) [2]

## [Tratamiento](#) [3]

Jue, 22/08/2019 - 14:18 -- aaor10

La listeriosis se trata con antibióticos. Es esencial tomar medidas lo antes posible para evitar una infección grave.

Idioma Undefined

- [Leer más sobre Tratamiento](#) [3]

## [¿Cómo se diagnostica la listeriosis?](#) [4]

Jue, 22/08/2019 - 14:17 -- aaor10

La listeriosis generalmente se diagnostica mediante un cultivo bacteriano (una prueba de laboratorio) que se hace a partir de una muestra de tejido o líquido del cuerpo, como la sangre, el líquido cefalorraquídeo o la placenta.

Idioma Undefined

- [Leer más sobre ¿Cómo se diagnostica la listeriosis?](#) [4]

## [Síntomas](#) [5]

Jue, 22/08/2019 - 14:16 -- aaor10

Las personas con listeriosis invasiva generalmente manifiestan síntomas [entre una y cuatro semanas](#) después de la ingesta de alimentos contaminados con la bacteria. En algunos casos los síntomas aparecen el mismo día y cabe la posibilidad de que aparezcan hasta 70 días después de ingerir el alimento contaminado.

La listeriosis puede causar una variedad de síntomas, según la persona o la parte del cuerpo afectada. Generalmente provoca fiebre y diarrea, pero este tipo de infección por listeria es raramente diagnosticado.

Idioma Undefined

- [Leer más sobre Síntomas](#) [5]

# Páginas

- 1
  - [2](#) [6]
  - [»](#) [6]
  - [última](#) [6]
- 

**Source URL:** <https://sanidad.castillalamancha.es/tipo-faqs/listeriosis>

## Links

[1] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/medidas-de-prevencion>

[2] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/que-hacer-tras-la-ingesta-de-un-alimento-que-pueda-estar-contaminado-por-listeria>

[3] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/tratamiento>

[4] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/como-se-diagnostica-la-listeriosis>

[5] <https://sanidad.castillalamancha.es/content/sintomas>

[6] <https://sanidad.castillalamancha.es/tipo-faqs/listeriosis?page=1>