

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 80349

CN: 708344

**ACIDOS OMEGA 3 ARISTO 1000MG 100 CAPSULAS
BLANDAS (250ML) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos esten contraindicados.

Nº REG: 80349

CN: 708343

**ACIDOS OMEGA 3 ARISTO 1000MG 28 CAPSULAS
BLANDAS (75ML) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos esten contraindicados.

Nº REG: 76981

CN: 695990

**ACIDOS OMEGA 3 KERN PHARMA 1.000MG 28 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos esten contraindicados.

Nº REG: 76981

CN: 696107

**ACIDOS OMEGA 3 KERN PHARMA 1.000MG 100
CAPSULAS BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos esten contraindicados.

Nº REG: 76636

CN: 693891

**ACIDOS OMEGA 3 RATIOPHARM 1000MG 28 CAPSULAS
BLANDAS (FRASCO) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 76636

CN: 695743

**ACIDOS OMEGA 3 RATIOPHARM 1000MG 100 CAPSULAS
BLANDAS (FRASCO) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

Nº REG: 77502

CN: 698027

**ACIDOS OMEGA 3 STADA 1000MG 28 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos esten contraindicados.

Nº REG: 77502

CN: 698028

**ACIDOS OMEGA 3 STADA 1000MG 100 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos esten contraindicados.

Nº REG: 79347

CN: 704713

**ACIDOS OMEGA 3 STRIDES 1000MG 100 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos esten contraindicados.

Nº REG: 79347

CN: 704712

**ACIDOS OMEGA 3 STRIDES 1000MG 28 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos esten contraindicados.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 76326

CN: 692655

**ACIDOS OMEGA 3 TARBIS 1000MG 28 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

Nº REG: 76326

CN: 692659

**ACIDOS OMEGA 3 TARBIS 1000MG 100 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

Nº REG: 76202

CN: 692217

**ACIDOS OMEGA 3 TEVA 1000MG 100 CAPSULAS
BLANDAS (FRASCO) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

Nº REG: 76202

CN: 692213

**ACIDOS OMEGA 3 TEVA 1000MG 28 CAPSULAS
BLANDAS (FRASCO) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

Nº REG: 77451

CN: 697774

**ACIDOS OMEGA-3 CINFA 1000MG 100 CAPSULAS
BLANDAS (FRASCO) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 77451

CN: 697771

**ACIDOS OMEGA-3 CINFA 1000MG 28 CAPSULAS
BLANDAS (BLISTER) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

Nº REG: 77451

CN: 697773

**ACIDOS OMEGA-3 CINFA 1000MG 28 CAPSULAS
BLANDAS (FRASCO) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

Nº REG: 77451

CN: 697772

**ACIDOS OMEGA-3 CINFA 1000MG 100 CAPSULAS
BLANDAS (BLISTER) EFG**

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos estan contraindicados.

Nº REG: 62630

CN: 675256

**ACUOLENS 3MG/ML + 5.5MG/ML COLIRIO EN SOLUC 30
ENVASES UNIDOSIS DE 0.5ML**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de sindrome de Sjögren

Nº REG: 83717

CN: 724459

**ACUVISC 5MG/ML 30 ENVASES UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO
EN SOLUCION**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectados por el Sindrome de Sjögren.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 77789

CN: 698749

**CARMELOSA QUALIGEN 5MG/ML 30 ENVASES UNIDOSIS
0,4ML COLIRIO SOLUCION**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren

Nº REG: 78502

CN: 701637

**CARMELOSA STADA 5MG/ML 30 ENVASES UNIDOSIS DE
0,4ML COLIRIO SOLUCION**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren

Nº REG: 5255

CN: 936518

CODEISAN 1,26MG/ML 250ML JARABE

INDICACIONES: Pacientes neoplásicos con tos persistente

Nº REG: 5255

CN: 795419

CODEISAN 1,26MG/ML 125ML JARABE

INDICACIONES: Pacientes neoplásicos con tos persistente

Nº REG: 1778

CN: 796052

CODEISAN 28,7MG 20 COMPRIMIDOS

INDICACIONES: Pacientes neoplásicos con tos persistente

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 1778

CN: 795971

CODEISAN 28,7MG 10 COMPRIMIDOS

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

Nº REG: 60189

CN: 698110

DUPHALAC 10G SOLUCION ORAL EN SOBRE 10 STICKS

INDICACIONES: Encefalopatia portosistemica y paraplejia

Nº REG: 60189

CN: 694760

DUPHALAC ORAL 50 SOBRES SOLUCION ORAL

INDICACIONES: Encefalopatia portosistemica y paraplejia

Nº REG: 60189

CN: 650316

DUPHALAC 10 SOBRES SOLUCION ORAL

INDICACIONES: Encefalopatia portosistemica y paraplejia

Nº REG: 60189

CN: 698109

DUPHALAC 10G SOLUCION ORAL EN SOBRE 50 STICKS

INDICACIONES: Encefalopatia portosistemica y paraplejia

Nº REG: 46197

CN: 748582

**DUPHALAC 667MG/ML SOLUCION ORAL 1 BOTELLA DE
800ML**

INDICACIONES: Encefalopatia portosistemica y paraplejia

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 46197

CN: 748590

**DUPHALAC 667MG/ML SOLUCION ORAL 1 BOTELLA DE
200ML**

INDICACIONES: Encefalopatía portosistémica y paraplejía

Nº REG: 20709

CN: 824078

**FLUDAN CODEINA 10MG/5ML 200ML SOLUCION
ORAL**

INDICACIONES: Pacientes neoplásicos con tos persistente

Nº REG: 66367

CN: 650196

**HIDRATHEA 9MG/ML 1 FRASCO DE 10ML COLIRIO EN
SOLUCION**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectados de síndrome de Sjögren

Nº REG: 78527

CN: 701700

**HIPROMELOSA STADA 3,2MG/ML 30 ENVASES UNIDOSIS
0,5ML COLIRIO SOLUCION**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectados de síndrome de Sjögren

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 24797

CN: 768184

HISTAVERIN 10MG/5ML 100ML JARABE

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

Nº REG: 24797

CN: 673090

HISTAVERIN 10MG/5ML JARABE FRASCO CON 250ML

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

Nº REG: 69299

CN: 659921

LACTULOSA LAINCO 10G 10 SOBRES SOLUCION ORAL
EFG

INDICACIONES: Encefalopatia portosistemica y paraplejia

Nº REG: 69300

CN: 659923

LACTULOSA LAINCO 3.33G/5ML SOLUCION ORAL 1
BOTELLA DE 800ML EFG

INDICACIONES: Encefalopatia portosistemica y paraplejia

Nº REG: 69300

CN: 659922

LACTULOSA LAINCO 3.33G/5ML 1 BOTELLA DE 200 ML
SOLUCION ORAL EFG

INDICACIONES: Encefalopatia portosistemica y paraplejia

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 59469

CN: 653453

**LACTULOSA LEVEL 66,75G/100ML 200ML SOLUCION
ORAL**

INDICACIONES: Encefalopatia portosistemica y paraplejia

Nº REG: 114962001

CN: 720858

**MOVENTIG 12,5MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Financiacion restringida a la indicacion:Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (EIO) en pacientes adultos oncologicos con una respuesta inadecuada a los laxantes.

Nº REG: 114962001

CN: 705258

**MOVENTIG 12,5MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Financiacion restringida a la indicacion:Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (EIO) en pacientes adultos oncologicos con una respuesta inadecuada a los laxantes.

Nº REG: 114962005

CN: 720859

**MOVENTIG 25MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELICULA**

INDICACIONES: Financiacion restringida a la indicacion:Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (EIO) en pacientes adultos oncologicos con una respuesta inadecuada a los laxantes.

Nº REG: 114962005

CN: 705260

**MOVENTIG 25MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELICULA**

INDICACIONES: Financiacion restringida a la indicacion:Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (EIO) en pacientes adultos oncologicos con una respuesta inadecuada a los laxantes.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 65343

CN: 794719

NOTUSIN 100ML SOLUCION ORAL

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

Nº REG: 65343

CN: 795112

NOTUSIN 250ML SOLUCION ORAL

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

Nº REG: 61982

CN: 755215

**OCULOTECT 50MG/ML FRASCO 10ML COLIRIO EN
SOLUCION**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de sindrome de Sjögren

Nº REG: 61983

CN: 755223

**OCULOTECT 50MG/ML 20 ENVASES UNIDOSIS 0,4ML
COLIRIO EN SOLUCION**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de sindrome de Sjögren

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 71342

CN: 664167

**OFARSIN 2MG/G 30 ENVASES UNIDOSIS DE 0.6G GEL
OPTALMICO**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren

Nº REG: 65476

CN: 873141

OMACOR 1000MG 28 CAPSULAS BLANDAS

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos están contraindicados

Nº REG: 65476

CN: 873166

OMACOR 1000MG 100 CAPSULAS BLANDAS

INDICACIONES: Pacientes con hipertrigliceridemia grave en los que los fibratos están contraindicados

Nº REG: 59691

CN: 794388

**OPONAF 10G/SOBRE 20 SOBRES POLVO PARA
SOLUCION ORAL**

INDICACIONES: Encefalopatía portosistémica y paraplejía

Nº REG: 59691

CN: 794768

**OPONAF 10G/SOBRE 50 SOBRES POLVO PARA
SOLUCION ORAL**

INDICACIONES: Encefalopatía portosistémica y paraplejía

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 69689

CN: 673141

**PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5G 30 SOBRES POLVO
EFERVESCENTE**

INDICACIONES: Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis

Nº REG: 68088

CN: 656187

**PLANTAGO OVATA CINFA 3,5G 15 SOBR POLVO SUSPE
ORAL**

INDICACIONES: Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis

Nº REG: 68088

CN: 656188

**PLANTAGO OVATA CINFA 3,5G 30 SOBR POLVO SUSPE
ORAL**

INDICACIONES: Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis

Nº REG: 73919

CN: 680089

**PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5G 15 SOBRES POLVO
PARA SUSPENSION ORAL**

INDICACIONES: Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis

Nº REG: 73919

CN: 679726

**PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5G 30 SOBRES POLVO
PARA SUSPENSION ORAL**

INDICACIONES: Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 68514

CN: 658578

**PLANTAGO OVATA NORMON 3,5G 30 SOB MONODO POL
SU OR**

INDICACIONES: Enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis

Nº REG: 54807

CN: 937052

PRAXILENE 100MG 50 CAPSULAS

INDICACIONES: Claudicacion intermitente

Nº REG: 08463003

CN: 672137

**RELISTOR 12MG/0,6ML 7 VIALES + 7 JERINGAS
PRECARGADAS SOL INYECTABLE**

INDICACIONES: Pacientes oncologicos

Nº REG: 08463001

CN: 672136

**RELISTOR 12MG/0,6ML 1 VIAL 0,6ML SOLUCION
INYECTABLE**

INDICACIONES: Pacientes oncologicos

Nº REG: 24379

CN: 650104

**ROMILAR 15MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN
SOLUCION**

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 62114

CN: 659144

SICCAFLUID 0,25% 10G GEL OFTALMICO

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren

Nº REG: 66890

CN: 651516

**SICCAFLUID 2,5MG/G GEL OFTALMICO 30 ENVASES
UNIDOSIS 0,5 G**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren

Nº REG: 66890

CN: 651517

**SICCAFLUID 2,5MG/G GEL OFTALMICO 60 ENVASES
UNIDOSIS 0,5 G**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren

Nº REG: 32357

CN: 656685

TOSEINA 2MG/ML 250ML SOLUCION ORAL

INDICACIONES: Pacientes neoplásicos con tos persistente

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 30982

CN: 893263

TOSIDRIN 10MG/ML 1 FRASCO 30ML GOTAS ORALES EN SOLUCION

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

Nº REG: 30982

CN: 805036

TOSIDRIN 10MG/ML 1 FRASCO 15ML GOTAS ORALES EN SOLUCION

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

Nº REG: 48422

CN: 652354

TUSCALMAN 15MG 20 SUPOSITARIOS NIÑOS

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

Nº REG: 46733

CN: 714436

TUSCALMAN 3MG/ML 150ML JARABE

INDICACIONES: Pacientes neoplasicos con tos persistente

Nº REG: 63926

CN: 817700

VISCOFRESH 1% 10 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO EN SOLUCION

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjögren

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO - FINANCIACION RESTRINGIDA PARA DETERMINADAS INDICACIONES

Nº REG: 63926

CN: 818658

VISCOFRESH 1% 30 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectados de síndrome de Sjögren

Nº REG: 64260

CN: 876466

**VISCOFRESH 5MG/ML 30 ENVASES UNIDOSIS 0.4 ML
COLIRIO EN SOLUCION**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectados de síndrome de Sjögren

Nº REG: 56872 03-08-2011

CN: 722012

**VISCOFRESH 5MG/ML 30 ENVASES UNIDOSIS 0,4ML
COLIRIO EN SOLUCION**

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectados de síndrome de Sjögren

Nº REG: 64260

CN: 876458

VISCOFRESH 0,5% 10 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO

INDICACIONES: Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectados de síndrome de Sjögren
