

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81213

CN: 712510

ACARIZAX 90 LIOFILIZADOS ORALES

INDICACIONES: Restringido a pacientes adultos (18-65 años), diagnosticados por su historia clínica y prueba positiva de sensibilización a ácaros del polvo doméstico (prueba cutánea de prick y/o IgE específica), que presenten asma alérgica por ácaros del polvo doméstico, parcialmente controlada con corticosteroides inhalados y asociada a rinitis alérgica por ácaros del polvo doméstico, de leve a severa. El estado del asma del paciente debe ser cuidadosamente evaluado antes de iniciar el tratamiento. El medicamento será prescrito por un médico especialista en alergología o neumología.

Nº REG: 81213

CN: 712509

ACARIZAX 30 LIOFILIZADOS ORALES

INDICACIONES: Restringido a pacientes adultos (18-65 años), diagnosticados por su historia clínica y prueba positiva de sensibilización a ácaros del polvo doméstico (prueba cutánea de prick y/o IgE específica), que presenten asma alérgica por ácaros del polvo doméstico, parcialmente controlada con corticosteroides inhalados y asociada a rinitis alérgica por ácaros del polvo doméstico, de leve a severa. El estado del asma del paciente debe ser cuidadosamente evaluado antes de iniciar el tratamiento. El medicamento será prescrito por un médico especialista en alergología o neumología.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 00150001

CN: 999831

ACTOS 15MG 28 COMPRIMIDOS

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2

En monoterapia

- en pacientes (especialmene aquellos con sobrepeso) con control insuficiente con dieta y ejercicio en los que el tratamiento con metformina se considera inadecuado, por existir contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- metformina, en pacientes (especialmente aquellos con sobrepeso) con control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- una sulfonilurea, solo en pacientes que presentan intolerancia a metformina o en los que metformina esta contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con

- metformina y una sulfonilurea, en pacientes (especialmente aquellos con sobrepeso) con control glucemico inadecuado a pesar de la doble terapia oral.(NUEVA INDICACION)

Pioglitazona tambien esta indicado en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia (NUEVA INDICACION)

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 00150009

CN: 999832

ACTOS 15MG 56 COMPRIMIDOS

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2

En monoterapia

- en pacientes (especialmene aquellos con sobrepeso) con control insuficiente con dieta y ejercicio en los que el tratamiento con metformina se considera inadecuado, por existir contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- metformina, en pacientes (especialmente aquellos con sobrepeso) con control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- una sulfonilurea, solo en pacientes que presentan intolerancia a metformina o en los que metformina esta contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con

- metformina y una sulfonilurea, en pacientes (especialmente aquellos con sobrepeso) con control glucemico inadecuado a pesar de la doble terapia oral.(NUEVA INDICACION)

Pioglitazona tambien esta indicado en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia (NUEVA INDICACION)

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 00150004

CN: 999833

ACTOS 30MG 28 COMPRIMIDOS

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2

En monoterapia

- en pacientes (especialmene aquellos con sobrepeso) con control insuficiente con dieta y ejercicio en los que el tratamiento con metformina se considera inadecuado, por existir contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- metformina, en pacientes (especialmente aquellos con sobrepeso) con control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- una sulfonilurea, solo en pacientes que presentan intolerancia a metformina o en los que metformina esta contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con

- metformina y una sulfonilurea, en pacientes (especialmente aquellos con sobrepeso) con control glucemico inadecuado a pesar de la doble terapia oral.(NUEVA INDICACION)

Pioglitazona tambien esta indicado en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia (NUEVA INDICACION)

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 00150010

CN: 999834

ACTOS 30MG 56 COMPRIMIDOS

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2

En monoterapia

- en pacientes (especialmene aquellos con sobrepeso) con control insuficiente con dieta y ejercicio en los que el tratamiento con metformina se considera inadecuado, por existir contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- metformina, en pacientes (especialmente aquellos con sobrepeso) con control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- una sulfonilurea, solo en pacientes que presentan intolerancia a metformina o en los que metformina esta contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con

- metformina y una sulfonilurea, en pacientes (especialmente aquellos con sobrepeso) con control glucemico inadecuado a pesar de la doble terapia oral.(NUEVA INDICACION)

Pioglitazona tambien esta indicado en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia (NUEVA INDICACION)

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 72537

CN: 665660

**AGRELAN 75MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT
PELI (BLISTER PVC/PE/PVDC) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
▣ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
▣ Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
-Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
-Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Nº REG: 83460

CN: 723694

**ALCOTINA 40MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Uso restringido del medicamento en pacientes con hipercolesterolemia severa con alto riesgo cardiovascular (especialmente pacientes con hipercolesterolemia familiar) que no alcancen sus objetivos de tratamiento con 20 mg, y en los que se llevara a cabo un seguimiento rutinario bajo la supervision del especialista.

Nº REG: 80156

CN: 707655

**ALPROSTADIL RECORDATI 3MG/G 4
APLICADORES CREMA**

INDICACIONES: Tratamiento de hombres mayor o igual a 18 años de edad con disfuncion erectil, con incapacidad para obtener o mantener una ereccion adecuada para una actividad sexual satisfactoria.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 82063

CN: 716201

**ALZIL 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Uso restringido del medicamento en pacientes con hipercolesterolemia severa con alto riesgo cardiovascular (especialmente pacientes con hipercolesterolemia familiar) que no alcancen sus objetivos de tratamiento con 20 mg, y en los que se llevara a cabo un seguimiento rutinario bajo la supervision del especialista.

Nº REG: 70082

CN: 653189

**ARAHORMO 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB) sintomática en varones con aumento de tamaño de la próstata con objeto de:

- Mejorar los síntomas.
- Reducir el riesgo de retención urinaria aguda.
- Reducir la necesidad de cirugía, incluidas la resección transuretral de la próstata (RTUP) y la prostatectomía.

ARAHORMO 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG produce regresión del crecimiento prostático, mejora el flujo urinario y mejora los síntomas relacionados con la HPB.

Nº REG: 83937

CN: 725110

**ARROX 30MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Uso restringido para pacientes con hipercolesterolemia severa con alto riesgo cardiovascular (especialmente pacientes con hipercolesterolemia familiar) que no alcancen sus objetivos de tratamiento con 20 mg, y en los que se llevara a cabo un seguimiento rutinario bajo la supervision del especialista.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 55545

CN: 949438 **ATERINA 15MG 60 CAPSULAS
BLANDAS**

INDICACIONES: Su uso se restringe al Tratamiento de la insuficiencia venosa cronica exclusivamente para pacientes en estadios C3* (*solo con edema moderado o grave de la escala VCSS) a C6 de la clasificacion clinica CEAP. La duracion del tratamiento son tres meses.

Nº REG: 035895010

CN: 723626 **AVIDART 0,5MG 30 CAPSULAS BLANDAS**

INDICACIONES: Tratamiento de los sintomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP). Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 035895010IP

CN: 726726 **AVIDART 0,5MG 30 CAPSULAS BLANDAS**

INDICACIONES: Tratamiento de los sintomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP). Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 65178

CN: 727529 **AVIDART 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS**

INDICACIONES: Tratamiento de los sintomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP). Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 110655009

CN: 710324

**BRILIQUE 60MG 60 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Uso restringido para la siguiente indicacion:
administrado conjuntamente con acido acetilsalicilico (AAS), para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en pacientes adultos con antecedentes de infarto de miocardio (IM) como terapia de continuacion del ticagrelor 90mg y con alto riesgo de desarrollar un acontecimiento aterotrombotico, es decir, con al menos uno de los siguientes factores de riesgo de aterotrombosis: edad mayor o igual a 65 años, diabetes mellitus que precisa medicacion, un segundo IM anterior, evidencia de ECA (enfermedad arterial coronaria) en multiples vasos, o disfuncion renal cronica en fase no terminal.

Nº REG: 10655004

CN: 665929

**BRILIQUE 90MG 56 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Brilique, administrado conjuntamente con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en pacientes adultos con Sindromes Coronarios Agudos (angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMCEST]), incluidos los pacientes controlados con tratamiento medico y los sometidos a una intervencion coronaria percutanea (ICP) o a un injerto de derivacion de arteria coronaria (IDAC).

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 111696003

CN: 703897

**BYDUREON 2MG POLVO Y DISOLV SUSP INY
LIB PROL 4 PLUMAS PREC DOSIS UNIC**

INDICACIONES: Bydureon esta indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glucemico en combinacion con otros medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina basal, cuando el tratamiento utilizado, junto con la dieta y el ejercicio, no logran un adecuado control glucemico y que sean pacientes con sobrepeso cuyo indice de masa corporal sea igual o mayor a 30 que no hayan alcanzado un control glucemico adecuado con las dosis maximas toleradas de los otros hipoglucemiantes.

Nº REG: 06362003

CN: 658304

**BYETTA 10MCG 1 PLUMA PRECARGADA
SOLUCION INYECTABLE 60 DOSIS**

INDICACIONES: BYETTA esta indicado para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en combinacion con:

- metformina
- sulfonilureas
- tiazolidindionas
- metformina y una sulfonilurea
- metformina y una tiazolidindiona

en pacientes con sobrepeso cuyo indice de masa corporal sea igual o mayor a 30, que no hayan alcanzado un control glucemico adecuado con las dosis maximas toleradas de estos tratamientos orales.

BYETTA esta tambien indicado como tratamiento coadyuvante a insulina basal con o sin metformina y/o pioglitazona en pacientes adultos con sobrepeso cuyo indice de masa corporal sea igual o mayor a 30 que no hayan alcanzado un adecuado control glucemico con estos medicamentos.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 06362001

CN: 658301

BYETTA 5MCG 1 PLUMA PRECARGADA
SOLUCION INYECTABLE 60 DOSIS

INDICACIONES: BYETTA esta indicado para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en combinacion con:

- metformina
- sulfonilureas
- tiazolidindionas
- metformina y una sulfonilurea
- metformina y una tiazolidindiona

en pacientes con sobrepeso cuyo indice de masa corporal sea igual o mayor a 30, que no hayan alcanzado un control glucemico adecuado con las dosis maximas toleradas de estos tratamientos orales.

BYETTA esta tambien indicado como tratamiento coadyuvante a insulina basal con o sin metformina y/o pioglitazona en pacientes adultos con sobrepeso cuyo indice de masa corporal sea igual o mayor a 30 que no hayan alcanzado un adecuado control glucemico con estos medicamentos.

Nº REG: 55500

CN: 957530

CARNICOR 100MG/ML 10 VIALES BEBIBLES
10ML SOLUCION ORAL

INDICACIONES: Carnicor solucion oral esta indicado en niños y adultos en las siguientes situaciones:

- Tratamiento de las deficiencias primarias y secundarias de L-carnitina (ver seccion 5.1)
- Tratamiento de la encefalopatia hiperamonemica y/o hepatotoxicidad debida a sobredosis/toxicidad por acido valproico (ver seccion 5.1)
- Tratamiento profilactico en pacientes en tratamiento con acido valproico que presentan riesgo incrementado de hepatotoxicidad (ver seccion 5.1)

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 55334

CN: 957548 **CARNICOR 200MG/ML 10 AMPOLLAS 5ML
SOLUCION INYECTABLE**

INDICACIONES: Carnicor solucion inyectable esta indicado en niños y adultos en las siguientes situaciones:

- Tratamiento de las deficiencias primarias y secundarias de L-carnitina (ver seccion 5.1)
- Tratamiento de la encefalopatía hiperamonémica y/o hepatotoxicidad debida a sobredosis/toxicidad por ácido valproico (ver seccion 5.1)
- Tratamiento profiláctico en pacientes en tratamiento con ácido valproico que presentan riesgo incrementado de hepatotoxicidad (ver seccion 5.1)
- Tratamiento de la deficiencia secundaria de L-carnitina en pacientes sometidos a hemodialisis a largo plazo (ver seccion 5.1)

Nº REG: 55501

CN: 962373 **CARNICOR 300MG/ML 1 FRASCO 40ML
SOLUCION ORAL**

INDICACIONES: Carnicor solucion oral esta indicado en niños y adultos en las siguientes situaciones:

- Tratamiento de las deficiencias primarias y secundarias de L-carnitina (ver seccion 5.1)
- Tratamiento de la encefalopatía hiperamonémica y/o hepatotoxicidad debida a sobredosis/toxicidad por ácido valproico (ver seccion 5.1)
- Tratamiento profiláctico en pacientes en tratamiento con ácido valproico que presentan riesgo incrementado de hepatotoxicidad (ver seccion 5.1)

Nº REG: 71821

CN: 664473 **CLOPIDOGREL ABABOR 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevención de acontecimientos aterotrombóticos en:

- ▣ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos días antes hasta un máximo de 35 días), un infarto cerebral (desde 7 días antes hasta un máximo de 6 meses después) o que padecen enfermedad arterial periférica establecida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71821

CN: 664477

**CLOPIDOGREL ABABOR 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
▣ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
▣ Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS). - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

Nº REG: 71774

CN: 664412

**CLOPIDOGREL ALMUS 75MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTO CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

Nº REG: 71774

CN: 704449

**CLOPIDOGREL ALMUS 75MG 50 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Para mayor informacion, ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71676

CN: 695490

**CLOPIDOGREL ALTER 75MG 50 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
☐ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
☐ Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71676

CN: 664686

**CLOPIDOGREL ALTER 75MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
▣ Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 09568003

CN: 664322

CLOPIDOGREL APOTEX 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos días antes hasta un maximo de 35 días), un infarto cerebral (desde 7 días antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
o Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
o Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
- En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 09568005

CN: 691720

CLOPIDOGREL APOTEX 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos días antes hasta un maximo de 35 días), un infarto cerebral (desde 7 días antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
o Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
o Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
- En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76987

CN: 696009

CLOPIDOGREL AUROVITAS 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76987

CN: 696007

CLOPIDOGREL AUROVITAS 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76987

CN: 724528

CLOPIDOGREL AUROVITAS 75MG 84
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se les ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, para los que no es adecuado el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

Nº REG: 71660

CN: 672841

CLOPIDOGREL AUROVITAS SPAIN 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71660

CN: 673254

**CLOPIDOGREL AUROVITAS SPAIN 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIER PELIC EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
■ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

Nº REG: 71622

CN: 690037

**CLOPIDOGREL CINFAMED 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71622

CN: 725093

CLOPIDOGREL CINFAMED 75MG 84
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular:
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71622

CN: 663283

**CLOPIDOGREL CINFAMED 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Nº REG: 72811

CN: 672497

**CLOPIDOGREL CODRAMOL 75MG 28 COMPR
REC PEL (BLISTPVC/PE/PVDC/AL)EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- ▣ Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (desde los primeros dias hasta un maximo de 35 dias), infarto cerebral (desde los 7 primeros dias hasta un maximo de 6 meses despues) o arteriopatía periferica establecida

Nº REG: 72807

CN: 672495

**CLOPIDOGREL DERMOGEN 75MG 28 COMP
REC PEL (BLIST PVC/PE/PVDC/AL) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- ▣ Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (desde los primeros dias hasta un maximo de 35 dias), infarto cerebral (desde los 7 primeros dias hasta un maximo de 6 meses despues) o arteriopatía periferica establecida

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71621

CN: 663284

**CLOPIDOGREL ESSETI 75MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
■ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

Nº REG: 72801

CN: 672524

**CLOPIDOGREL FARMALID 75MG 28 COMPR
REC PEL (BLIST PVC/PE/PVDC/AL) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
■ Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (desde los primeros dias hasta un maximo de 35 dias), infarto cerebral (desde los 7 primeros dias hasta un maximo de 6 meses despues) o arteriopatía periferica establecida.

Nº REG: 72799

CN: 672513

**CLOPIDOGREL FARMALIDER 75MG 28 COMP
REC PEL (BLIS PVC/PE/PVDC/AL) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
■ Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (desde los primeros dias hasta un maximo de 35 dias), infarto cerebral (desde los 7 primeros dias hasta un maximo de 6 meses despues) o arteriopatía periferica establecida.

Nº REG: 72799

CN: 672512

**CLOPIDOGREL FARMALIDER 75MG 28
COMPRIMIDOS REC PEL (BLIST AL/AL) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
■ Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (desde los primeros dias hasta un maximo de 35 dias), infarto cerebral (desde los 7 primeros dias hasta un maximo de 6 meses despues) o arteriopatía periferica establecida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71662

CN: 689840

CLOPIDOGREL KERN PHARMA 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICU EFG

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Nº REG: 71662

CN: 664265

CLOPIDOGREL KERN PHARMA 75MG 28
COMPRIMIDO RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 109556003

CN: 699407

**CLOPIDOGREL KRKA 75MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
. Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

Nº REG: 109556004

CN: 699408

**CLOPIDOGREL KRKA 75MG 50 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
. Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 9562001

CN: 723854

CLOPIDOGREL KRKA D.D. 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos:
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular:
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 9562001

CN: 723853

**CLOPIDOGREL KRKA D.D. 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG**

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos:
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular:
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

Nº REG: 71827

CN: 673033

**CLOPIDOGREL MABO 75MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
□Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71827

CN: 722478

**CLOPIDOGREL MABO 75MG 50 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en :
-pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Nº REG: 09559011

CN: 693933

**CLOPIDOGREL MYLAN 75MG 50 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado:
- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

Nº REG: 09559014

CN: 663249

**CLOPIDOGREL MYLAN PHARMA 75MG 28
COMPRIM RECUBIERTOS CON PELIC EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
-Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 72672

CN: 713577

**CLOPIDOGREL NORMON 75MG 50 COMPR
RECUB PEL (AL/AL-POLIAMIDA-PVC) EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se les ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 72672

CN: 672423

**CLOPIDOGREL NORMON 75MG 28 COMP REC
PEL (BLIST AL/PVDC/PE/PVC) EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se les ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 72672

CN: 672422

**CLOPIDOGREL NORMON 75MG 28 COMP REC
PEL (BLISTER AL/PVC/AL/PA) EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se les ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 72672

CN: 713578

**CLOPIDOGREL NORMON 75MG 50 COMPRIM
RECUB PELIC (PVC/PE/PVDC/AL) EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se les ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

Nº REG: 71414

CN: 664305

**CLOPIDOGREL PENSA 75 MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76928

CN: 696135

CLOPIDOGREL PHARMA COMBIX 75MG 50
COMPRIM RECUB PELICULA (AL/AL) EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76928

CN: 696134

CLOPIDOGREL PHARMA COMBIX 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUB PEL (AL/AL) EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76928

CN: 726432

CLOPIDOGREL PHARMA COMBIX 75MG 84
COMPRIMIDOS RECUB PELICULA EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos:
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
-Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
-Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular:
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71624

CN: 691704

CLOPIDOGREL QUALIGEN 75MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- ▣ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- ▣ Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Nº REG: 71624

CN: 663287

CLOPIDOGREL QUALIGEN 75MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- ▣ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- ▣ Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71624

CN: 725067

CLOPIDOGREL QUALIGEN 75MG 84
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Nº REG: 77638

CN: 698360

CLOPIDOGREL RANBAXY 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado:
- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 114975013

CN: 706842

CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente sindrome agudo coronario:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 114975013

CN: 726210

CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75MG 84
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que han sufrido recientemente sindrome agudo coronario:
Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 114975013

CN: 726209

CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que han sufrido recientemente sindrome agudo coronario:
Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 114975017

CN: 706841

**CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75MG 28 COMPR
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente sindrome agudo coronario:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 09541002

CN: 673155

**CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71372

CN: 673260

CLOPIDOGREL SANDOZ 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71372

CN: 704005

CLOPIDOGREL SANDOZ 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71619

CN: 722479

**CLOPIDOGREL STADA 75MG 84 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
☐ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
☐ Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71619

CN: 663246

CLOPIDOGREL STADA 75MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- ▣ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- ▣ Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.(NUEVA INDICACION)

Nº REG: 71619

CN: 681401

CLOPIDOGREL STADA 75MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- ▣ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- ▣ Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 722454

**CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 84 COMP REC
PEL (BLIST OPA/AL/PVC-AL) EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
▣ Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 722458

**CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 84 COMP REC
PEL (BLIS PVC/ACLAR-AL) EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
▣ Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 714437

**CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 50 COMPR
RECUB PEL (BLIS PVC/ACLAR-AL) EFG**

INDICACIONES: -Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
-Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 714440

CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 50
COMPRIMIDOS REC PELIC (FRASCO) EFG

INDICACIONES: -Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
-Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 713405

**CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 28 COMP REC
PEL (BLIS PVC/ACLAR/PVC-AL) EFG**

INDICACIONES: -Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
-Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 714438

**CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 50 COMP REC
PEL (BLIS PVC/ACLAR/PVC-AL) EFG**

INDICACIONES: -Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
-Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 714439

CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 28 COMPRIM
RECUBIERT PELIC (FRASCO) EFG

INDICACIONES: -Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
-Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 716605

**CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 50 COMP REC
PEL (BLIST OPA/AL/PVC- AL) EFG**

INDICACIONES: -Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
-Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 722459

**CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 84 COMP REC
PE (BLIST PVC/ACLAR/PVC-AL) EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
☐ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
☐ Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 716604

**CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 28 COMP REC
PEL (BLIST OPA/AL/PVC- AL) EFG**

INDICACIONES: -Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
-Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81358

CN: 713389

**CLOPIDOGREL STADAGEN 75MG 28 COMPR
RECUB PEL (BLIST PVC/ACLAR/AL) EFG**

INDICACIONES: -Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
-Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.
Para mayor informacion ver seccion 5.1.

Nº REG: 72800

CN: 691346

**CLOPIDOGREL TARBIS 75MG 50 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
- Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (desde los primeros dias hasta un maximo de 35 dias), infarto cerebral (desde los 7 primeros dias hasta un maximo de 6 meses despues) o arteriopatía periferica establecida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 72800

CN: 672526

**CLOPIDOGREL TARBIS 75MG 28 COMPRIM REC
PELIC (BLIST PVC/PE/PVDC/AL) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
□ Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (desde los primeros dias hasta un maximo de 35 dias), infarto cerebral (desde los 7 primeros dias hasta un maximo de 6 meses despues)
o arteriopatía periférica establecida

Nº REG: 71773

CN: 704400

**CLOPIDOGREL TECNIGEN 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periférica establecida.
Para mayor informacion, ver seccion 5.1.

Nº REG: 71773

CN: 664413

**CLOPIDOGREL TECNIGEN 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues)
o que padecen enfermedad arterial periférica establecida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 109540011

CN: 724626

**CLOPIDOGREL TEVA 75MG 84 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos
aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un
infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes
hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde
7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o
que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente
sindrome agudo coronario:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento
ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin
onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha
colocado un stent despues de una intervencion
coronaria percutanea, en combinacion con acido
acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con
elevacion del segmento ST, que son candidatos a
terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y
tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen
al menos un factor de riesgo para acontecimientos
vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con
antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un
indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion
con AAS esta indicado para la prevencion de
acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos,
incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 109540011

CN: 724624

**CLOPIDOGREL TEVA 75MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
☐ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
☐ Pacientes adultos que han sufrido recientemente sindrome agudo coronario:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 109540011

CN: 724625

**CLOPIDOGREL TEVA 75MG 50 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos
aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un
infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes
hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde
7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o
que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
▣ Pacientes adultos que han sufrido recientemente
sindrome agudo coronario:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento
ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin
onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha
colocado un stent despues de una intervencion
coronaria percutanea, en combinacion con acido
acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con
elevacion del segmento ST, que son candidatos a
terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y
tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen
al menos un factor de riesgo para acontecimientos
vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con
antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un
indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion
con AAS esta indicado para la prevencion de
acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos,
incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 74243

CN: 681261

**CLOPIDOGREL UR 75MG 50 COMPRIM RECUB
PELIC (BLISTER PA/ALL/PVC-AL) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Nº REG: 74243

CN: 681260

**CLOPIDOGREL UR 75MG 28 COMPRIM RECUB
PELIC (BLISTER PA/ALL/PVC-AL) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 74243

CN: 681259

**CLOPIDOGREL UR 75MG 50 COMPRIM RECUB
PEL (BLISTER PVC/PE/PVDC-AL) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Nº REG: 74243

CN: 681258

**CLOPIDOGREL UR 75MG 28 COMPRIM RECUB
PEL (BLISTER PVC/PE/PVDC-AL) EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:

- Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71812

CN: 654559

**CLOPIDOGREL VIR 75MG 50 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
■ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

Nº REG: 71825

CN: 664582

**CLOPIDOGREL VIR PHARMA 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
■ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71704

CN: 664658

**CLOPIDOGREL VISO FARMACEUTICA 75MG 28
COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG**

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos:
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que sufren de sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q), incluidos los pacientes sometidos a colocacion de un stent despues de la intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (ASA).
- Infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, en combinacion con AAS en pacientes tratados medicamento elegibles para terapia trombolitica.
Prevencion de eventos aterotromboticos y tromboembolicos en la fibrilacion auricular. En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo de eventos vasculares, no es adecuado el tratamiento con antagonistas de la vitamina K (AVK) y tampoco quienes tienen un bajo riesgo de sangrado, el clopidogrel esta indicado en combinacion con AAS para la prevencion de eventos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo el accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71704

CN: 720967

**CLOPIDOGREL VISO FARMACEUTICA 75MG 50
COMPRIMIDOS RECUB PELIC EFG**

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos:
Clopidogrel esta indicado en:
Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
Pacientes adultos que sufren de sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q), incluidos los pacientes sometidos a colocacion de un stent despues de la intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (ASA).
- Infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, en combinacion con AAS en pacientes tratados medicamento elegibles para terapia trombolitica.
Prevencion de eventos aterotromboticos y tromboembolicos en la fibrilacion auricular. En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo de eventos vasculares, no es adecuado el tratamiento con antagonistas de la vitamina K (AVK) y tampoco quienes tienen un bajo riesgo de sangrado, el clopidogrel esta indicado en combinacion con AAS para la prevencion de eventos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo el accidente cerebrovascular.

Nº REG: 06354005

CN: 659384

**COMPETACT 15MG/850MG 56 COMPRIMID
RECUBIE PELICULA**

INDICACIONES: Competact esta indicado en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, especialmente pacientes con sobrepeso, que no alcanzan el control glucemico suficiente con la dosis maxima tolerada de metformina oral en monoterapia.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 112801002

CN: 697254 **CONSTELLA 290MCG 28 CAPSULAS DURAS**

INDICACIONES: Constella esta indicado para el tratamiento sintomatico del síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E) de caracter grave en adultos que no hayan respondido adecuadamente a ninguno de los tratamientos de eleccion del SII-E disponibles o que sean intolerantes a los mismos.

Nº REG: 82407

CN: 718851 **CORTITAPE 2.250MG 8 APOSITOS ADHESIVOS
MEDICAMENTOSOS**

INDICACIONES: Tratamiento de la psoriasis cronica en placas localizada en areas dificiles de tratar (por ejemplo, las rodillas, los codos y la cara anterior de la tibia), en un area no superior al 5% de la superficie corporal.

Nº REG: 03268004

CN: 660113 **CHOLESTAGEL 625MG 180 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Cholestagel, en combinacion con un inhibidor de la 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A (HGM-CoA) reductasa (estatina), esta indicado como tratamiento coadyuvante a la dieta para proporcionar una reduccion adicional en las concentraciones de colesterol de lipoproteina de baja densidad (C-LDL) en aquellos pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria que no estan controlados adecuadamente solo con estatina. Cholestagel, como monoterapia, esta indicado como tratamiento coadyuvante a la dieta para la reduccion del colesterol total y del C-LDL elevados, en pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria para los que el tratamiento con estatinas es inapropiado o no es bien tolerado. Cholestagel se puede utilizar junto con ezetimiba, con o sin estatina, en pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria incluyendo a los pacientes con hipercolesterolemia familiar.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 58404

CN: 990325

**DECAPEPTYL MENSUAL 3.75MG 1 VIAL POLVO
Y DIS SUSP LIB PROL INYECT**

INDICACIONES:

- Tratamiento del cancer de prostata hormono-dependiente, localmente avanzado o metastasico.
- Tratamiento del cancer de prostata hormono-dependiente, localizado de alto riesgo o localmente avanzado, en combinacion con radioterapia. El efecto favorable del medicamento es mas pronunciado y mas frecuente en aquellos pacientes que no han estado sometidos previamente a otros tratamientos hormonales.
- Endometriosis genital y extragenital:
La duracion del tratamiento se halla limitada a 6 meses (ver Reacciones Adversas). No es recomendable empezar un segundo tratamiento con triptorelina o con cualquier otro analogo de la GnRH.
- Fibromas uterinos.
- Infertilidad femenina:
Tratamiento complementario asociado a gonadotropinas (HMG, FSH, HCG) durante la induccion de la ovulacion para la fecundacion in vitro y transferencia de embrion (F.I.V.T.E.).
- Pubertad precoz:
En las niñas, el tratamiento debe iniciarse antes de los 8 años y, en los niños, antes de los 10 años.

Nº REG: 78901

CN: 703003

DOVIDA 30MG 30 CAPSULAS BLANDAS

INDICACIONES: Su uso se restringe al Tratamiento de la insuficiencia venosa cronica exclusivamente para pacientes en estadios C3* (*solo con edema moderado o grave de la escala VCSS) a C6 de la clasificacion clinica CEAP. La duracion del tratamiento son tres meses.

Nº REG: 114960001

CN: 705018

**DUA VIVE 0,45/20MG 28 COMPRIMIDOS DE
LIBERACION MODIFICADA**

INDICACIONES: Tratamiento en segunda linea para el manejo de los sintomas asociados a la deficiencia de estrogenos en mujeres que no son candidatas a una terapia con progestagenos.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 10619009

CN: 672141 **DUOPLAVIN 75/100MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos en pacientes adultos que ya estan tomando clopidogrel y acido acetilsalicilico (AAS). DuoPlavin es una combinacion de medicamentos a dosis fijas para el tratamiento de continuacion en:

- Síndrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea.
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica.

Nº REG: 80633

CN: 709879 **DUTAQR 0,5MG 30 CAPSULAS BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los sintomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP). Reduccion del riesgo de padecer retencion urinaria aguda (RUA) y de intervencion quirurgica en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 82987

CN: 721174 **DUTASTERIDA ABAMED 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los sintomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP). Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP. Para obtener informacion sobre los efectos del tratamiento y las poblaciones de pacientes estudiados en los ensayos clinicos, ver la seccion 5.1.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81195

CN: 712367 **DUTASTERIDA AMNEAL 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 79630

CN: 705703 **DUTASTERIDA APOTEX 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.
En la seccion 5.1 se puede encontrar informacion sobre los efectos del tratamiento y las poblaciones de pacientes estudiados en los ensayos clinicos.

Nº REG: 81493

CN: 713833 **DUTASTERIDA ARISTO 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 82432

CN: 719060 **DUTASTERIDA AUROBINDO 0,5MG 30
CAPSULAS BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81244

CN: 712671

**DUTASTERIDA AUROVITAS SPAIN 0,5MG 30
CAPSULAS BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con sintomas de HBP de moderados a graves.

Nº REG: 80595

CN: 709796

**DUTASTERIDA CINFA 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.
En la seccion 5.1 se puede encontrar informacion sobre los efectos del tratamiento y las poblaciones de pacientes estudiados en los ensayos clinicos.

Nº REG: 78989

CN: 703403

**DUTASTERIDA COMBIX 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS (OPA/AL/PVC/AL) EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.
En la seccion 5.1 se puede encontrar informacion sobre los efectos del tratamiento y las poblaciones de pacientes estudiados en los ensayos clinicos.

Nº REG: 78989

CN: 703402

**DUTASTERIDA COMBIX 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS (PVC/PVDC/AL) EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con sintomas de moderados a graves de HBP.
En la seccion 5.1 se puede encontrar informacion sobre los efectos del tratamiento y las poblaciones de pacientes estudiados en los ensayos clinicos.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81498

CN: 713842 **DUTASTERIDA KERN PHARMA 0,5MG 30
CAPSULAS BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 81574

CN: 714089 **DUTASTERIDA KRKA 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 81781

CN: 714983 **DUTASTERIDA MYLAN 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 81153

CN: 712214 **DUTASTERIDA PENSA 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.
En la seccion 5.1 se puede encontrar informacion sobre los efectos del tratamiento y las poblaciones de pacientes estudiados en los ensayos clinicos.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81938

CN: 715576 **DUTASTERIDA QUALIGEN 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 77635

CN: 698357 **DUTASTERIDA RATIOPHARM 0,5MG 30
CAPSULAS BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 81431

CN: 713606 **DUTASTERIDA SANDOZ 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 80581

CN: 709770 **DUTASTERIDA STADA 0,5MG 30 CAPSULAS
BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.
En la seccion 5.1 se puede encontrar informacion sobre los efectos del tratamiento y las poblaciones de pacientes estudiados en los ensayos clinicos.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83259

CN: 722264 **DUTASTERIDA TARBIS 0,5MG 30 CAPSULAS**
BLANDAS EFG

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 81152

CN: 712213 **DUTASTERIDA TECNIGEN 0,5MG 30 CAPSULAS**
BLANDAS EFG

INDICACIONES: -Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
-Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.
En la seccion 5.1 se puede encontrar informacion sobre los efectos del tratamiento y las poblaciones de pacientes estudiados en los ensayos clinicos.

Nº REG: 77634

CN: 698356 **DUTASTERIDA TEVA 0,5MG 30 CAPSULAS**
BLANDAS EFG

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 79750

CN: 706191 **DUTASTERIDA VIR 0,5MG 30 CAPSULAS**
BLANDAS EFG

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de prostata (HBP).
Reduccion del riesgo de retencion aguda de orina (RAO) y de cirugia en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81794

CN: 715019 **DUTRYS 0,5MG 30 CAPSULAS BLANDAS EFG**

INDICACIONES: Tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de próstata (HBP).
Reducción del riesgo de retención aguda de orina (RAO) y de cirugía en pacientes con síntomas de moderados a graves de HBP.

Nº REG: 1181300001

CN: 723802 **DUZALLO 200/200MG 30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Tratamiento de la hiperuricemia en pacientes con gota, con una afección sintomática relevante y cuya hiperuricemia no ha respondido adecuadamente con alopurinol a dosis máxima tolerada, priorizando el uso de la combinación de alopurinol con lesinurad antes que el uso de febuxostat.

Nº REG: 1181300003

CN: 723803 **DUZALLO 300/200MG 30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Tratamiento de la hiperuricemia en pacientes con gota, con una afección sintomática relevante y cuya hiperuricemia no ha respondido adecuadamente con alopurinol a dosis máxima tolerada, priorizando el uso de la combinación de alopurinol con lesinurad antes que el uso de febuxostat.

Nº REG: 08503009

CN: 700621 **EFIENT 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Efient, co-administrado con ácido acetilsalicílico (AAS), está indicado para la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes con síndrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevación del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) primaria o aplazada.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 08503002

CN: 700620

**EFIENT 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Efient, co-administrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes con sindrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 66620

CN: 650840

**ELIGARD MENSUAL 7,5MG 1 JERIN POLV Y 1
JER DISOLV**

INDICACIONES: Tratamiento del carcinoma de prostata avanzado hormonodependiente.

Nº REG: 11691002

CN: 654803

**ELIQUIS 2,5MG 20 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Medicamento sujeto a un Protocolo farmacoclinico al objeto de restringir su financiacion a la indicacion autorizada:

- Prevencion del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugia electiva de reemplazo de cadera o rodilla.
- Prevencion del ictus y de la embolia sistematica en pacientes adultos con fibrilacion auricular no valvular (FANV) con uno o mas factores de riesgo tales como ictus o ataque isquemico transitorio (AIT) previos; edad mayor o igual 75 años; hipertension; diabetes mellitus; insuficiencia cardiaca sintomatica (mayor o igual Clase 2 escala NYHA).

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 11691003

CN: 654804 **ELIQUIS 2,5MG 60 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Medicamento sujeto a un Protocolo farmacoclinico al objeto de restringir su financiacion a la indicacion autorizada:
-Prevencion del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugia electiva de reemplazo de cadera o rodilla.
-Prevencion del ictus y de la embolia sistematica en pacientes adultos con fibrilacion auricular no valvular (FANV) con uno o mas factores de riesgo tales como ictus o ataque isquemico transitorio (AIT) previos; edad mayor o igual 75 años; hipertension; diabetes mellitus; insuficiencia cardiaca sintomatica (mayor o igual Clase 2 escala NYHA).

Nº REG: 111691009

CN: 694840 **ELIQUIS 5MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Medicamento sujeto a un Protocolo farmacoclinico al objeto de restringir su financiacion a la indicacion autorizada:
Prevencion del ictus y de la embolia sistematica en pacientes adultos con fibrilacion auricular novalvular (FANV) con uno o mas factores de riesgo tales como ictus o ataque isquemico transitorio (AIT) previos; edad mayor o igual 75 años; hipertension; diabetes mellitus; insuficiencia cardiaca sintomatica (mayor o igual Clase 2 escala NYHA).

Nº REG: 60653

CN: 686709 **ENGERIX B 20MCG 1 JERINGA PRECARGADA
1ML**

INDICACIONES: inmunizacion activa frente a la infeccion por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en personas no inmunes.
Los grupos de riesgo especificos para la vacunacion se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 60652

CN: 877514 **ENGERIX-B JUNIOR 10MCG/0,5ML 1 JERINGA
0,5ML SUSPENSION INYECTABLE**

INDICACIONES: inmunizacion activa frente a la infeccion por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en personas no inmunes.
Los grupos de riesgo especificos para la vacunacion se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales.

Nº REG: 12750001

CN: 700644 **ESMYA 5MG 28 COMPRIMIDOS**

INDICACIONES: El acetato de ulipristal esta indicado para el tratamiento preoperatorio de los sintomas moderados y graves de miomas uterinos en mujeres adultas en edad reproductiva siendo la duracion del tratamiento hasta dos ciclos de tres meses.
Tratamiento intermitente repetido de los sintomas moderados a graves de los miomas uterinos en mujeres adultas en edad fertil que no son candidatas a cirugia.

Nº REG: 69741

CN: 660850 **FINASTERIDA ALMUS 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Finasterida esta indicada en el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) sintomatica. El tratamiento con finasterida:
- Mejora los sintomas
- Reduce el riesgo de retencion urinaria aguda
- Reduce la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.
Finasterida produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HBP.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 67869

CN: 654557 **FINASTERIDA ALTER 5MG 28 COMPRIM RECUBI
PELICU EFG**

INDICACIONES: Finasterida esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) sintomatica en varones con objeto de:

- Mejorar los sintomas.
- Reducir el riesgo de retencion urinaria aguda.
- Reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

Finasterida produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HBP.

Nº REG: 69259

CN: 659829 **FINASTERIDA APOTEX 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Finasterida esta indicada en el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) sintomatica. El tratamiento con finasterida:

- Mejora los sintomas
- Reduce el riesgo de retencion urinaria aguda
- Reduce la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

Finasterida produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HBP.

Nº REG: 69985

CN: 673110 **FINASTERIDA AUROBINDO 5MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG**

INDICACIONES: Finasterida Aurobindo 5 mg esta indicada en el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) con objeto de:

- ▣ Producir regresion del crecimiento prostatico, mejorar el flujo urinario y mejorar los sintomas relacionados con la HBP.
- ▣ Reducir la incidencia de retencion urinaria aguda y la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

Finasterida Aurobindo solo debe administrarse a pacientes con crecimiento prostatico (volumen de la prostata por encima de 40 ml)

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81398

CN: 713535

**FINASTERIDA AUROVITAS 5MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Tratamiento y control de la hiperplasia benigna de próstata (HBP) en pacientes adultos con aumento de tamaño de la próstata con objeto de:

- Producir regresión del crecimiento prostático, mejorar el flujo urinario y mejorar los síntomas relacionados con la HBP.
- Reducir la incidencia de retención urinaria aguda y la necesidad de cirugía, incluidas la resección transuretral de la próstata (RTUP) y la prostatectomía.

Nº REG: 68042

CN: 656054

**FINASTERIDA BENEL 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Finasterida está indicada en el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de próstata (HBP) sintomática. El tratamiento con finasterida:

- Mejora los síntomas
- Reduce el riesgo de retención urinaria aguda
- Reduce la necesidad de cirugía, incluidas la resección transuretral de la próstata (RTUP) y la prostatectomía.

Finasterida produce regresión del crecimiento prostático, mejora el flujo urinario y mejora los síntomas relacionados con la HBP.

Nº REG: 78509

CN: 701647

**FINASTERIDA BLUEFISH 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Finasterida 5 mg comprimidos está indicado para el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de próstata (HBP) para:

- la regresión del crecimiento prostático, mejorar el flujo urinario y mejorar los síntomas asociados con la HBP,
- reducir la incidencia de retención urinaria aguda y reducir la necesidad de cirugía incluida la resección transuretral de la próstata (RTUP) y prostatectomía.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 67857

CN: 654524 **FINASTERIDA CINFA 5MG 28 COMPRIM RECUB
PELIC EFG**

INDICACIONES: Finasterida cinfa 5 mg comprimidos esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:

- Mejorar los sintomas
- Reducir el riesgo de retencion urinaria aguda
- Reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

Finasterida cinfa 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HBP.

Nº REG: 67100

CN: 652280 **FINASTERIDA KERN PHARMA 5MG 28
COMPRIMIDOS EFG**

INDICACIONES: Esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia prostatica benigna (HPB) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:

- mejorar los sintomas.
- reducir el riesgo de retencion urinaria aguda.
- reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

Finasterida Kern Pharma 5 mg comprimidos produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HPB.

Nº REG: 67844

CN: 654479 **FINASTERIDA MABO 5MG 28 COMPRIM RECUB
PELICULA EFG**

INDICACIONES: Finasterida Mabo 5 mg comprimidos esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia prostatica benigna (HPB) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:

- Mejorar los sintomas.
- Reducir el riesgo de retencion urinaria aguda.
- Reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

Finasterida Mabo 5 mg comprimidos produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HPB.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 70596

CN: 664111

**FINASTERIDA NORMON 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Finasterida Accord 5 mg esta indicado para el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) para:

- la regresion del crecimiento prostatico, mejorar el flujo urinario y mejorar los sintomas asociados con la HBP,
- reducir la incidencia de retencion urinaria aguda y la necesidad de cirugia incluida la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y prostatectomia.

Finasterida debera administrarse a pacientes con crecimiento prostatico (volumen de la prostata por encima de aproximadamente 40 ml).

Nº REG: 67102

CN: 652282

**FINASTERIDA PENZA 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUB PEL EFG**

INDICACIONES: Esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia prostatica benigna (HPB) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:

- mejorar los sintomas.
- reducir el riesgo de retencion urinaria aguda.
- reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

Finasterida Genkern 5 mg comprimidos produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HPB.

Nº REG: 68468

CN: 658479

**FINASTERIDA QUALIGEN 5MG 28 COMPRIM
RECUB PELI EFG**

INDICACIONES:

- Finasterida esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:
 - o Mejorar los sintomas
 - o Reducir el riesgo de retencion urinaria aguda
 - o Reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.
- Finasterida produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HBP.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 67190

CN: 652620 **FINASTERIDA RATIOPHARM 5MG 28 COMPR
RECUB PELI EFG**

INDICACIONES: Esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia prostatica benigna (HPB) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:

- mejorar los sintomas.
- reducir el riesgo de retencion urinaria aguda.
- reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

Finasterida Stada 5 mg comprimidos produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HPB.

Nº REG: 66657

CN: 652124 **FINASTERIDA SANDOZ 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Esta indicada en el tratamiento y control de la hiperplasia prostatica benigna (HPB) causada por el aumento de tamaño de la prostata, mejorando el flujo urinario y los sintomas asociados con (HPB), reduciendo la incidencia de retencion urinaria aguda y reduciendo la necesidad de cirugia.

Finasterida Sandoz 5 mg comprimidos debe ser administrado a pacientes con aumento prostatico (volumen prostatico por encima de 40 ml)

Nº REG: 67206

CN: 671930 **FINASTERIDA STADA 5MG 28 COMPRIMIDOS
EFG**

INDICACIONES: Esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia prostatica benigna (HPB) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:

- mejorar los sintomas.
- reducir el riesgo de retencion urinaria aguda.
- reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

Finasterida Ratiopharm 5 mg comprimidos produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HPB.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 68467

CN: 658478

FINASTERIDA TARBIS 5MG 28 COMPRIM
RECUB PELI EFG

INDICACIONES: - Finasterida esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:
o Mejorar los sintomas
o Reducir el riesgo de retencion urinaria aguda
o Reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.
- Finasterida produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HBP.

Nº REG: 68168

CN: 656370

FINASTERIDA TECNIGEN 5MG 28 COMPRIMID
RECU PEL EFG

INDICACIONES: Finasterida esta indicada en el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) sintomatica. El tratamiento con finasterida:
- Mejora los sintomas
- Reduce el riesgo de retencion urinaria aguda
- Reduce la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.
Finasterida produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HBP.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 70122

CN: 661596

FINASTERIDA TEVA 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUB PELI EFG

INDICACIONES: Finasterida esta indicada en el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) con objeto de:
▣ Producir regresion del crecimiento prostatico, mejorar el flujo urinario y mejorar los sintomas relacionados con la HBP.
▣ Reducir la incidencia de retencion urinaria aguda y la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.
Finasterida debera administrarse a pacientes con crecimiento prostatico (volumen de la prostata por encima de 40 ml).

Nº REG: 69258

CN: 663395

FINASTERIDA VIR 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

INDICACIONES: Finasterida esta indicada en el tratamiento de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:
- Mejorar los sintomas
- Reducir el riesgo de retencion urinaria aguda
- Reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.
Finasterida produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HBP.

Nº REG: 113887001

CN: 701919

FLUENZ TETRA 10 ENVAS PULVER (VIDRIO)
BANDEJAS 0,2ML SUSP PULV NASAL

INDICACIONES: Profilaxis de la gripe en niños y adolescentes a partir de los 24 meses y menores de 18 años de edad, incluidos en las recomendaciones de Vacunacion Antigripal emitidas por las autoridades de Salud Publica en cada temporada epidemica; exceptuando los niños en los cuales la vacuna esta contraindicada segun se indica en la ficha tecnica.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 72727

CN: 684559 **GELISTROL 50MCG/G 1 TUBO 10G GEL
VAGINAL**

INDICACIONES: Se restringe unicamente la financiacion a la indicacion:
Tratamiento local de la sequedad vaginal en mujeres
postmenopausicas con atrofia vaginal severa
causada por: sindrome de Sjögren, radioterapia cancer
cervix, radioterapia pelvica,
tratamiento con quimioterapia y enfermedad autoinmune.

Nº REG: 59344

CN: 909630 **GINECRIN DEPOT 3,75MG 1 VIAL + 1 AMP
POLVO Y DISOLV SUSPENSION INYECTAB**

INDICACIONES:

- tratamiento del mioma uterino (fibroma uterino) durante un periodo de 6 meses. Este tratamiento puede emplearse como medida pre-operatoria y coadyuvante a la cirugia o como tratamiento sintomatico alternativo definitivo en las mujeres cercanas a la menopausia que no desean la cirugia.
- tratamiento de la endometriosis durante un periodo de 6 meses. Puede emplearse solo o como terapia conjunta con la cirugia.
- tratamiento de la pubertad precoz central, diagnosticada clinicamente por la aparicion de los caracteres sexuales secundarios antes de los ocho años en niñas y de los nueve en niños.

Nº REG: 07421005

CN: 660701 **GLUBRAVA 15MG/850MG 56 COMPRIMIDOS
RECUBIERT PELIC**

INDICACIONES: Glubrava esta indicado en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, especialmente pacientes con sobrepeso, que no alcanzan el control glucemico suficiente con la dosis maxima tolerada de metformina oral en monoterapia.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 1161146005

CN: 716517 **GLYXAMBI 10/5MG 30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Pacientes que esten en tratamiento con Linagliptina y Empaglifozina por separado despues de haber comprobado que responden adecuadamente a los dos antidiabeticos sin asociar, es decir en aquellos en los que el tratamiento esta estabilizado y es efectivo.

Nº REG: 1161146014

CN: 716516 **GLYXAMBI 25/5MG 30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Pacientes que esten en tratamiento con Linagliptina y Empaglifozina por separado despues de haber comprobado que responden adecuadamente a los dos antidiabeticos sin asociar, es decir en aquellos en los que el tratamiento esta estabilizado y es efectivo.

Nº REG: 68398

CN: 724710 **GRAZAX 75000 SQ-T 90 LIOFILIZADOS ORALES**

INDICACIONES: Tratamiento que modifica el curso de la rinitis y conjuntivitis inducida por polen de gramineas en adultos y niños (de 5 años o mayores) con sintomas clinicamente relevantes y diagnosticados mediante prueba cutanea de prick positiva y/o test de IgE especifica a polen de gramineas.

Nº REG: 68398

CN: 658358 **GRAZAX 75000 SQ-T 30 LIOFILIZADOS
ORALES**

INDICACIONES: Tratamiento que modifica el curso de la rinitis y conjuntivitis inducida por polen de gramineas en adultos y niños (de 5 años o mayores) (NUEVA) con sintomas clinicamente relevantes y diagnosticados mediante prueba cutanea de prick positiva y/o test de IgE especifica a polen de gramineas.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 09535002

CN: 663881

**GREPID 75MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en: �� Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

Nº REG: 61250

CN: 700677

**HAVRIX 1440 1 JERINGA PRECARGADA 1ML
SUSPENSION INYECTABLE**

INDICACIONES: Inmunizacion activa frente a la infeccion por el virus de la hepatitis A, en personas en riesgo de exposicion al VHA (los grupos de poblacion condierados de riesgo se especifican en la C 15/98 de la DGFYPS). HAVRIX, no previene la hepatitis causada por otros germenés tales como el virus de la hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E u otros patogenos conocidos que pueden infectar el higado. No se conoce la duracion de la inmunidad de la vacuna. Los individuos con anticuerpos especificos frente al VHA no precisan de la vacunacion, no obstante, no es necesaria la realizacion de estudios serologicos previos a la vacunacion. La vacunacion de personas inmunes no presenta riesgo aadido.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 61396

CN: 700676

**HAVRIX 720 1 JERINGA PRECARGADA 0,5ML
SUSPENSION INYECTABLE**

INDICACIONES: Inmunizacion activa frente a la infeccion por el virus de la hepatitis A, en personas en riesgo de exposicion al VHA (los grupos de poblacion condierados de riesgo se especifican en la C 15/98 de la DGFYPS).
HAVRIX, no previene la hepatitis causada por otros germen es tales como el virus de la hepatis B, hepatitis C, hepatitis E u otros patogenos conocidos que pueden infectar el higado.
No se conoce la duracion de la inmunidad de la vacuna.
Los individuos con anticuerpos especificos frente al VHA no precisan de la vacunacion, no obstante, no es necesaria la realizacion de estudios serologicos previos a la vacunacion. La vacunacion de personas inmunes no presenta riesgo añadido.

Nº REG: 01183028

CN: 652094

**HBVAXPRO 10MCG/ML 1 JERINGA
PRECARGADA 1ML SUSPENSION INYECTABLE**

INDICACIONES: HBVAXPRO esta indicada para la inmunizacion activa frente a la infeccion por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos en individuos de 16 años de edad y mayores considerados en riesgo de exposicion al virus de la hepatitis B.
Los grupos de riesgo especificos para la vacunacion se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales.
Se puede esperar que mediante la inmunizacion con HBVAXPRO tambien se prevenga la hepatitis D, dado que la hepatitis D (causada por el agente delta) no se presenta en ausencia de infeccion de hepatitis B.

Nº REG: 01183015

CN: 906826

**HBVAXPRO 40MCG/ML 1 VIAL 1ML
SUSPENSION INYECTABLE**

INDICACIONES: inmunizacion activa frente a la infeccion por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en pacientes adultos en predialisis y dialisis.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 01183024

CN: 652093 **HBVAXPRO 5MCG/0,5ML 1 JER PREC 0,5ML + 2
AGUJAS SUSPENSION INYECTABLE**

INDICACIONES: Inmunizacion activa frente a la infeccion por el virus de la hepatitis B causada por todos los subtipos conocidos, en niños y adolescentes (desde el nacimiento hasta los 15 años de edad) considerados en riesgo de exposicion al virus de la hepatitis B.
Los grupos de riesgo especificos para la vacunacion se determinan sobre la base de las recomendaciones oficiales.
Se puede esperar que mediante la inmunizacion con HBVAXPRO tambien se prevenga la hepatitis D, dado que la hepatitis D (causada por el agente delta) no se presenta en ausencia de infeccion de hepatitis B.

Nº REG: 113884006

CN: 702424 **INVOKANA 300MG 30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Tratamiento de aquellos pacientes diabeticos que con la dosis de 100 mg de canagliflozina no alcanzan el control glucemico.

Nº REG: 98070001

CN: 656355 **ISCOVER 75MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (desde los primeros dias hasta un maximo de 35 dias), infarto cerebral (desde los 7 primeros dias hasta un maximo de 6 meses despues) o arteriopatía periferica establecida.
Pacientes que presentan sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes que se han sometido a la colocacion de un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes que sufren infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, subsidiarios de terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 69257

CN: 659827

**LITACE 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
PELICULA EFG**

INDICACIONES: Finasterida esta indicada en el tratamiento y control de la hiperplasia benigna de prostata (HBP) sintomatica. El tratamiento con finasterida:
-Mejora los sintomas
-Reduce el riesgo de retencion urinaria aguda
-Reduce la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia. Finasterida produce regresion del crecimiento prostatico, mejora el flujo urinario y mejora los sintomas relacionados con la HBP.

Nº REG: 115993001

CN: 707035

**LIXIANA 15MG 10 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion del ictus y de la embolia sistemica en pacientes adultos con fibrilacion auricular no valvular (FANV) con uno o mas factores de riesgo tales como insuficiencia cardiaca congestiva, hipertension, edad mayor o igual a 75 años, diabetes mellitus, ictus o ataque isquemico transitorio (AIT) previos.

Nº REG: 115993005

CN: 707043

**LIXIANA 30MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion del ictus y de la embolia sistemica en pacientes adultos con fibrilacion auricular no valvular (FANV) con uno o mas factores de riesgo tales como insuficiencia cardiaca congestiva, hipertension, edad mayor o igual a 75 años, diabetes mellitus, ictus o ataque isquemico transitorio (AIT) previos.

Nº REG: 115993018

CN: 707044

**LIXIANA 60MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion del ictus y de la embolia sistemica en pacientes adultos con fibrilacion auricular no valvular (FANV) con uno o mas factores de riesgo tales como insuficiencia cardiaca congestiva, hipertension, edad mayor o igual a 75 años, diabetes mellitus, ictus o ataque isquemico transitorio (AIT) previos.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 74980

CN: 685615

**LUTRATE DEPOT 3,75MG 1 VIAL + 1 JERIN
PRECARG POLVO Y DISOLV SUSP INYEC**

INDICACIONES: LUTRATE DEPOT esta indicado para el tratamiento paliativo del cancer de prostata avanzado

Nº REG: 12811001

CN: 696754

**LYXUMIA 10MCG 1 PLUMA PRECARGADA 14
DOSIS SOLUCION INYECTABLE**

INDICACIONES: Lyxumia esta indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos para alcanzar el control glucemico, en combinacion con medicamentos hipoglucemiantes y/o insulina basal cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucemico adecuado y restringido para aquellos pacientes con Indice de Masa Corporal mayor que 30 Kg/m².
(ver secciones 4.2, 4.4 y 5.1 sobre los datos disponibles para las diferentes combinaciones).

Nº REG: 12811003

CN: 696752

**LYXUMIA 20MCG 2 PLUMAS PRECARGADAS 14
DOSIS SOLUCION INYECTABLE**

INDICACIONES: Lyxumia esta indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos para alcanzar el control glucemico, en combinacion con medicamentos hipoglucemiantes y/o insulina basal cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucemico adecuado y restringido para aquellos pacientes con Indice de Masa Corporal mayor que 30 Kg/m².
(ver secciones 4.2, 4.4 y 5.1 sobre los datos disponibles para las diferentes combinaciones).

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71882

CN: 664772 **MABOCLOP 75MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
■ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.

Nº REG: 84272

CN: 726167 **MISSITEL 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG**

INDICACIONES: El acetato de ulipristal esta indicado para el tratamiento preoperatorio de los sintomas moderados y graves de miomas uterinos en mujeres adultas en edad reproductiva siendo la duracion del tratamiento hasta dos ciclos de tres meses.
Tratamiento intermitente repetido de los sintomas moderados a graves de los miomas uterinos en mujeres adultas en edad fertil que no son candidatas a cirugia.

Nº REG: 71954

CN: 667297 **ORALAIR 300 IR 30 COMPRIMIDOS
SUBLINGUALES**

INDICACIONES: Tratamiento de la rinitis alergica con o sin conjuntivitis inducida por polen de gramineas en adultos, adolescentes y niños (mayores de cinco años) con sintomas clinicamente relevantes, confirmada por una prueba cutanea positiva y/o por una prueba positiva de IgE especifica al polen de gramineas.

Nº REG: 71953

CN: 667296 **ORALAIR INICIO 100/300 IR 1 X 3 + 1 X 28
COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

INDICACIONES: Tratamiento de la rinitis alergica con o sin conjuntivitis inducida por polen de gramineas en adultos, adolescentes y niños (mayores de cinco años) con sintomas clinicamente relevantes, confirmada por una prueba cutanea positiva y/o por una prueba positiva de IgE especifica al polen de gramineas.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 117251002

CN: 723345

**OZEMPIC 0,25MG 1 PLUMA PRECARGADA
1,5ML SOLUCION INYECTABLE**

INDICACIONES: tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en obesos con un indice de masa corporal igual o mayor de 30Kg/m2 y en terapia combinada con otros antidiabeticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucemico adecuado.

Nº REG: 1171251003

CN: 723346

**OZEMPIC 0,5MG 1 PLUMA PRECARGADA 1,5ML
SOLUCION INYECTABLE**

INDICACIONES: Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en obesos con un indice de masa corporal igual o mayor de 30Kg/m2 y en terapia combinada con otros antidiabeticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucemico adecuado.

Nº REG: 1171251005

CN: 723347

**OZEMPIC 1MG 1 PLUMA PRECARGADA 3ML
SOLUCION INYECTABLE**

INDICACIONES: Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en obesos con un indice de masa corporal igual o mayor de 30Kg/m2 y en terapia combinada con otros antidiabeticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucemico adecuado.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 111722002

CN: 694440

**PIOGLITAZONA ACCORD 15MG 28
COMPRIMIDOS EFG**

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada como tratamiento de segunda o tercera eleccion de la diabetes mellitus tipo 2, conforme se describe a continuacion:

En monoterapia

- En pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

- Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.

Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 111722005

CN: 694438

PIOGLITAZONA ACCORD 15MG 56
COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada como tratamiento de segunda o tercera eleccion de la diabetes mellitus tipo 2, conforme se describe a continuacion:
En monoterapia
- En pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.
- Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.
Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 111722012

CN: 694439

**PIOGLITAZONA ACCORD 30MG 28
COMPRIMIDOS EFG**

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada como tratamiento de segunda o tercera eleccion de la diabetes mellitus tipo 2, conforme se describe a continuacion:

En monoterapia

- En pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

- Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.

Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 111722015

CN: 694441

PIOGLITAZONA ACCORD 30MG 56
COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada como tratamiento de segunda o tercera eleccion de la diabetes mellitus tipo 2, conforme se describe a continuacion:

En monoterapia

- En pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

- Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.

Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83046

CN: 721448

PIOGLITAZONA AUROVITAS 15MG 56 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada como tratamiento de segunda o tercera linea de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, tal y como se describe a continuacion:
En monoterapia:
- en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.
En doble terapia oral en combinacion con:
- metformina, en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso) con un control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- una sulfonilurea, solo en pacientes adultos que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.
En triple terapia oral en combinacion con:
- metformina y una sulfonilurea, en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), con un control glucemico inadecuado, a pesar de la doble terapia oral.
- Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia (ver seccion 4.4).

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83046

CN: 721447

**PIOGLITAZONA AUROVITAS 15MG 28
COMPRIMIDOS EFG**

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada como tratamiento de segunda o tercera linea de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, tal y como se describe a continuacion:

En monoterapia:

- en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con:

- metformina, en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso) con un control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.

- una sulfonilurea, solo en pacientes adultos que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con:

- metformina y una sulfonilurea, en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), con un control glucemico inadecuado, a pesar de la doble terapia oral.

- Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia (ver seccion 4.4).

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83047

CN: 721450

PIOGLITAZONA AUROVITAS 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada como tratamiento de segunda o tercera linea de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, tal y como se describe a continuacion:
En monoterapia:
- en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.
En doble terapia oral en combinacion con:
- metformina, en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso) con un control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- una sulfonilurea, solo en pacientes adultos que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.
En triple terapia oral en combinacion con:
- metformina y una sulfonilurea, en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), con un control glucemico inadecuado, a pesar de la doble terapia oral.
- Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia (ver seccion 4.4).

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83047

CN: 721451

PIOGLITAZONA AUROVITAS 30MG 56
COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada como tratamiento de segunda o tercera linea de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, tal y como se describe a continuacion:

En monoterapia:

- en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con:

- metformina, en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso) con un control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.

- una sulfonilurea, solo en pacientes adultos que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con:

- metformina y una sulfonilurea, en pacientes adultos (particularmente aquellos con sobrepeso), con un control glucemico inadecuado, a pesar de la doble terapia oral.

- Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia (ver seccion 4.4).

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76481

CN: 693193

PIOGLITAZONA CINFA 15MG 56 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia - En pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- Metformina, en pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso) con un control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- Una sulfonilurea, solo en pacientes que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con

- Metformina y una sulfonilurea, en pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso), con un control glucemico inadecuado, a pesar de la doble terapia oral.

Pioglitazona tambien esta indicado en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia. Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76481

CN: 693191

PIOGLITAZONA CINFA 15MG 28 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia - En pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- Metformina, en pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso) con un control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- Una sulfonilurea, solo en pacientes que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con

- Metformina y una sulfonilurea, en pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso), con un control glucemico inadecuado, a pesar de la doble terapia oral.

Pioglitazona tambien esta indicado en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia. Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76485

CN: 693211

PIOGLITAZONA CINFA 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia - En pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- Metformina, en pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso) con un control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- Una sulfonilurea, solo en pacientes que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con

- Metformina y una sulfonilurea, en pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso), con un control glucemico inadecuado, a pesar de la doble terapia oral.

Pioglitazona tambien esta indicado en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia. Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 76485

CN: 693212

PIOGLITAZONA CINFA 30MG 56 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia - En pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- Metformina, en pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso) con un control glucemico inadecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.
- Una sulfonilurea, solo en pacientes que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

En triple terapia oral en combinacion con

- Metformina y una sulfonilurea, en pacientes (particularmente aquellos con sobrepeso), con un control glucemico inadecuado, a pesar de la doble terapia oral.

Pioglitazona tambien esta indicado en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia. Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 75152

CN: 686567

PIOGLITAZONA NORMON 15MG 28 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia:

En pacientes, particularmente aquellos con sobrepeso, en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral, en combinacion con Las siguientes sulfonilureas: clorpropamida, glibenclamida, gliclazida, glipizida, gliquidona, glisentida y tolbutamida. Solo en pacientes que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.

Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 75152

CN: 686569

PIOGLITAZONA NORMON 15MG 56 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:
En monoterapia:
En pacientes, particularmente aquellos con sobrepeso, en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.
En doble terapia oral, en combinacion con Las siguientes sulfonilureas: clorpropamida, glibenclamida, gliclazida, glipizida, gliquidona, glisentida y tolbutamida. Solo en pacientes que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.
Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.
Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 75153

CN: 686570

PIOGLITAZONA NORMON 30MG 28 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia:
En pacientes, particularmente aquellos con sobrepeso, en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.
En doble terapia oral, en combinacion con Las siguientes sulfonilureas: clorpropamida, glibenclamida, gliclazida, glipizida, gliquidona, glisentida y tolbutamida. Solo en pacientes que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.
Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.
Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 75153

CN: 686571

PIOGLITAZONA NORMON 30MG 56 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:
En monoterapia:
En pacientes, particularmente aquellos con sobrepeso, en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.
En doble terapia oral, en combinacion con Las siguientes sulfonilureas: clorpropamida, glibenclamida, gliclazida, glipizida, gliquidona, glisentida y tolbutamida. Solo en pacientes que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.
Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.
Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses despues para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los medicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 75358

CN: 687362

**PIOGLITAZONA STADA 15MG 28 COMPRIMIDOS
EFG**

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia

- En pacientes adultos (particularmente pacientes con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- Una sulfonilurea, solo en pacientes adultos que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.

Tras el inicio de la terapia con pioglitazona, los pacientes deben ser controlados despues de 3 a 6 meses para evaluar la idoneidad de la respuesta al tratamiento (p.ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestran una respuesta adecuada, se debe interrumpir la pioglitazona. En base a los riesgos potenciales de una terapia prolongada, los prescriptores deben confirmar con controles rutinarios que el beneficio de pioglitazona se mantiene.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 75358

CN: 687363

**PIOGLITAZONA STADA 15MG 56 COMPRIMIDOS
EFG**

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia

- En pacientes adultos (particularmente pacientes con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- Una sulfonilurea, solo en pacientes adultos que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.

Tras el inicio de la terapia con pioglitazona, los pacientes deben ser controlados despues de 3 a 6 meses para evaluar la idoneidad de la respuesta al tratamiento (p.ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestran una respuesta adecuada, se debe interrumpir la pioglitazona. En base a los riesgos potenciales de una terapia prolongada, los prescriptores deben confirmar con controles rutinarios que el beneficio de pioglitazona se mantiene.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 75359

CN: 687365

**PIOGLITAZONA STADA 30MG 28 COMPRIMIDOS
EFG**

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia

- En pacientes adultos (particularmente pacientes con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- Una sulfonilurea, solo en pacientes adultos que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.

Tras el inicio de la terapia con pioglitazona, los pacientes deben ser controlados despues de 3 a 6 meses para evaluar la idoneidad de la respuesta al tratamiento (p.ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestran una respuesta adecuada, se debe interrumpir la pioglitazona. En base a los riesgos potenciales de una terapia prolongada, los prescriptores deben confirmar con controles rutinarios que el beneficio de pioglitazona se mantiene.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 75359

CN: 687366

**PIOGLITAZONA STADA 30MG 56 COMPRIMIDOS
EFG**

INDICACIONES: Pioglitazona esta indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2:

En monoterapia

- En pacientes adultos (particularmente pacientes con sobrepeso), en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia.

En doble terapia oral en combinacion con

- Una sulfonilurea, solo en pacientes adultos que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina este contraindicada, y en los que no se logra un control glucemico adecuado independientemente de la dosis maxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia.

Pioglitazona tambien esta indicada en combinacion con insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucemico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia.

Tras el inicio de la terapia con pioglitazona, los pacientes deben ser controlados despues de 3 a 6 meses para evaluar la idoneidad de la respuesta al tratamiento (p.ej. reduccion en HbA1c). En los pacientes que no muestran una respuesta adecuada, se debe interrumpir la pioglitazona. En base a los riesgos potenciales de una terapia prolongada, los prescriptores deben confirmar con controles rutinarios que el beneficio de pioglitazona se mantiene.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 98069001

CN: 714433

**PLAVIX 75MG 84 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion secundaria de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 98069001

CN: 654542

PLAVIX 75MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos:

- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular

En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.(NUEVA INDICACION)

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 98069001AIP

CN: 665974 **PLAVIX 75MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
Pacientes que han sufrido un infarto de miocardio (desde los primeros dias hasta un maximo de 35 dias), infarto cerebral (desde los 7 primeros dias hasta un maximo de 6 meses despues) o arteriopatía periférica establecida.
Pacientes que presentan síndrome coronario agudo:
- Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (angina inestable o infarto de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes que se han sometido a la colocación de un stent después de una intervención coronaria percutánea, en combinación con ácido acetilsalicílico (AAS).
- Pacientes que sufren infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, subsidiarios de terapia trombolítica, en combinación con AAS.

Nº REG: 98069001AIP2

CN: 711550 **PLAVIX 75MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevención de acontecimientos aterotromboticos:
- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos días antes hasta un máximo de 35 días), un infarto cerebral (desde 7 días antes hasta un máximo de 6 meses después) o que padecen enfermedad arterial periférica establecida.
- Pacientes adultos que presentan un síndrome coronario agudo:
- Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent después de una intervención coronaria percutánea, en combinación con ácido acetilsalicílico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolítica, en combinación con AAS.
Prevención de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilación auricular
En pacientes adultos con fibrilación auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un índice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinación con AAS esta indicado para la prevención de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 98069001AIP3

CN: 711552

**PLAVIX 75MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos:

- Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
- Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
 - Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
 - Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.

Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular

En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 98069002

CN: 664304

**PLAVIX 75MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Clopidogrel esta indicado en:
-Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
-Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

Nº REG: 08442002

CN: 654796

PRADAXA 75MG 30 CAPSULAS DURAS

INDICACIONES: Prevencion primaria de episodios tromboembolicos venosos en pacientes adultos sometidos a cirugia de reemplazo total de cadera o cirugia de reemplazo total de rodilla, programadas en ambos casos.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 08442005

CN: 654799 **PRADAXA 110MG 10 CAPSULAS DURAS**

INDICACIONES: Prevencion primaria de episodios tromboembolicos venosos en pacientes adultos sometidos a cirugia de reemplazo total de cadera o cirugia de reemplazo total de rodilla, programadas en ambos casos. Prevencion del ictus y de la embolia sistematica en pacientes adultos con fibrilacion auricular novalvular (FANV), con uno o mas factores de riesgo tales como ictus o ataque isquemico transitorio(AIT) previos; edad mayor o igual 75 años; insuficiencia cardiaca (mayor o igual Clase II escala NYHA); diabetes mellitus; hipertension.

Nº REG: 08442006

CN: 654800 **PRADAXA 110MG 30 CAPSULAS DURAS**

INDICACIONES: Prevencion primaria de episodios tromboembolicos venosos en pacientes adultos sometidos a cirugia de reemplazo total de cadera o cirugia de reemplazo total de rodilla, programadas en ambos casos. Prevencion del ictus y de la embolia sistematica en pacientes adultos con fibrilacion auricular novalvular (FANV), con uno o mas factores de riesgo tales como ictus o ataque isquemico transitorio(AIT) previos; edad mayor o igual 75 años; insuficiencia cardiaca (mayor o igual Clase II escala NYHA); diabetes mellitus; hipertension.

Nº REG: 08442007

CN: 654801 **PRADAXA 110MG 60 CAPSULAS DURAS**

INDICACIONES: Prevencion primaria de episodios tromboembolicos venosos en pacientes adultos sometidos a cirugia de reemplazo total de cadera o cirugia de reemplazo total de rodilla, programadas en ambos casos. Prevencion del ictus y de la embolia sistematica en pacientes adultos con fibrilacion auricular novalvular (FANV), con uno o mas factores de riesgo tales como ictus o ataque isquemico transitorio(AIT) previos; edad mayor o igual 75 años; insuficiencia cardiaca (mayor o igual Clase II escala NYHA); diabetes mellitus; hipertension.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 08442011

CN: 654802 **PRADAXA 150MG 60 CAPSULAS DURAS**

INDICACIONES: Prevencion del ictus y de la embolia sistematica en pacientes adultos con fibrilacion auricular novalvular (FANV), con uno o mas factores de riesgo tales como ictus o ataque isquemico transitorio(AIT) previos; edad mayor o igual 75 años; insuficiencia cardiaca (mayor o igual Clase II escala NYHA); diabetes mellitus; hipertension.

Nº REG: 08442003

CN: 654797 **PRADAXA 75MG 60 CAPSULAS DURAS**

INDICACIONES: Prevencion primaria de episodios tromboembolicos venosos en pacientes adultos sometidos a cirugia de reemplazo total de cadera o cirugia de reemplazo total de rodilla, programadas en ambos casos.

Nº REG: 83737

CN: 724504 **PRASUGREL ASIBILAN 10MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel Asibilan, coadministrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 83738

CN: 724505 **PRASUGREL ASIBILAN 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel coadministrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83509

CN: 723808

**PRASUGREL KRKA 10MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Co-administrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p. ej., angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 83730

CN: 724494

**PRASUGREL LESVI 10MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel coadministrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 83729

CN: 724493

**PRASUGREL LESVI 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel coadministrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83532

CN: 723869

**PRASUGREL QUALIGEN 10MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Co-administrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p. ej., angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 83533

CN: 723870

**PRASUGREL QUALIGEN 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Co-administrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p. ej., angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 82929

CN: 720970

**PRASUGREL RATIOPHARM 10MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC EFG**

INDICACIONES: Prasugrel, coadministrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83098

CN: 721666

**PRASUGREL STADA 10MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel, co-administrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p. ej., angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 84066

CN: 725458

**PRASUGREL STADAGEN 10MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel, co-administrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p. ej., angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 84065

CN: 725456

**PRASUGREL STADAGEN 5MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel, co-administrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p. ej., angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 84615

CN: 727290

**PRASUGREL TECNIGEN 10MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel, co-administrado con ácido acetilsalicílico (AAS), está indicado para la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes adultos con síndrome coronario agudo (p. ej., angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevación del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 82930

CN: 720971

**PRASUGREL TEVA 10MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel, coadministrado con ácido acetilsalicílico (AAS), está indicado para la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes adultos con síndrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevación del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 83732

CN: 724496

**PRASUGREL VIRFUTON 10MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prasugrel coadministrado con ácido acetilsalicílico (AAS), está indicado para la prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes adultos con síndrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevación del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervención coronaria percutánea (ICP) primaria o aplazada.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83731

CN: 724495

PRASUGREL VIRFUTON 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG

INDICACIONES: Prasugrel coadministrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 57083

CN: 970517

PROCRIN 1MG/0,2ML 1 VIAL MULTIDOSIS 2,8 ML (14 DOSIS) SOLUCION INYECT

INDICACIONES:

- Tratamiento paliativo del carcinoma de prostata avanzado.
- Tratamiento del carcinoma de prostata localizado de alto riesgo y localmente avanzado hormonodependiente en combinacion con radioterapia.(NUEVA INDICACION)
- Infertilidad femenina. Tratamiento complementario asociado a la administracion de gonadotropinas exogenas, para la induccion de la ovulacion en tecnicas de reproduccion asistida.

Nº REG: 59830

CN: 748772

PROSCAR 5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

INDICACIONES: indicado en el tratamiento de la hiperplasia prostatica benigna (HPB) sintomatica en varones con aumento de tamaño de la prostata con objeto de:

- mejorar los sintomas
- reducir el riesgo de retencion urinaria aguda
- reducir la necesidad de cirugia, incluidas la reseccion transuretral de la prostata (RTUP) y la prostatectomia.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 81882

CN: 715433 **ROSUVASTATINA ACCORD 40MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Uso restringido del medicamento en pacientes con hipercolesterolemia severa con alto riesgo cardiovascular (especialmente pacientes con hipercolesterolemia familiar) que no alcancen sus objetivos de tratamiento con 20 mg, y en los que se llevara a cabo un seguimiento rutinario bajo la supervision del especialista.

Nº REG: 82111

CN: 716399 **ROSUVASTATINA ARISTO 40MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG**

INDICACIONES: Uso restringido del medicamento en pacientes con hipercolesterolemia severa con alto riesgo cardiovascular (especialmente pacientes con hipercolesterolemia familiar) que no alcancen sus objetivos de tratamiento con 20 mg, y en los que se llevara a cabo un seguimiento rutinario bajo la supervision del especialista.

Nº REG: 82380

CN: 718795 **ROSUVASTATINA MEIJI 40MG 28
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Uso restringido del medicamento en pacientes con hipercolesterolemia severa con alto riesgo cardiovascular (especialmente pacientes con hipercolesterolemia familiar) que no alcancen sus objetivos de tratamiento con 20 mg, y en los que se llevara a cabo un seguimiento rutinario bajo la supervision del especialista.

Nº REG: 82542

CN: 719535 **ROSUVASTATINA VIR 40MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Uso restringido del medicamento en pacientes con hipercolesterolemia severa con alto riesgo cardiovascular (especialmente pacientes con hipercolesterolemia familiar) que no alcancen sus objetivos de tratamiento con 20 mg, y en los que se llevara a cabo un seguimiento rutinario bajo la supervision del especialista.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 112815002

CN: 697871 **SELINCRO 18MG 14 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Selincro esta incluido en la prestacion farmaceutica del SNS para los pacientes incluidos dentro de programas oficiales de minimizacion de riesgo y deshabituacion alcoholica o drogodependencias, segun criterio de la autoridad sanitaria de cada CC.AA. Selincro esta indicado para la reduccion del consumo de alcohol en pacientes adultos con dependencia del alcohol que presentan un nivel de consumo de alcohol de alto riesgo (NCR), sin sintomas de abstinencia fisicos y que no requieran una desintoxicacion inmediata. Selincro solo se debe prescribir junto con apoyo psicossocial mantenido dirigido a incrementar la adherencia al tratamiento y a reducir el consumo de alcohol. El tratamiento con Selincro se debe iniciar unicamente en los pacientes que mantienen un NCR alto dos semanas despues de la evaluacion inicial.

Nº REG: 01174012

CN: 749648 **STARLIX 120MG 84 COMPRIMIDOS CUBIERTA
PELICULAR**

INDICACIONES: en terapia combinada con metformina en pacientes con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlados con una dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.

Nº REG: 01174005

CN: 749630 **STARLIX 60MG 84 COMPRIMIDOS CUBIERTA
PELICULAR**

INDICACIONES: en terapia combinada con metformina en pacientes con diabetes tipo 2 inadecuadamente controlados con una dosis maxima tolerada de metformina en monoterapia.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 57011

CN: 969626 **SUPREFACT 5,5ML 2 VIALES MULTIDOSIS SOL
INYECTABLE**

INDICACIONES: - en el hombre: carcinoma de prostata, cuando este indicado suprimir la produccion de hormonas testiculares.
- en la mujer: tratamiento complementario, en asociacion con gonadotropinas para la induccion de la ovulacion en un programa de fecundacion in vitro.

Nº REG: 57037

CN: 969931 **SUPREFACT NASAL 100MCG/PULSACION 2 ENV
100 DOSIS SOLUCION PULV NASAL**

INDICACIONES: carcinoma de prostata, cuando este indicado suprimir la produccion de hormonas testiculares.

Nº REG: 60079

CN: 696831 **SYNAREL 200MCG/PULV 1 FRASCO 8ML
SOLUCION PULVERIZACION NASAL**

INDICACIONES: Endometriosis de localizacion genital y extragenital (del estadio I al IV).
Programas de estimulacion ovarica controlada, previos a la fertilizacion ovarica controlada, previos a la fertilizacion in vitro, bajo la supervision de un especialidsta

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 09508003

CN: 662990

**SYNFLORIX 1JERINGA PRECARGADA + 1
AGUJA SUSPENSION INYECTABLE**

INDICACIONES: Inmunizacion activa frente a enfermedad invasora, neumonia y otitis media aguda causada por *Streptococcus pneumoniae* en lactantes y niños a partir de las 6 semanas hasta los 2 años de edad. En el ambito del Sistema Nacional de Salud, su prescripcion y uso se restringira a los niños desde 6 semanas a 2 años de edad pertenecientes a los siguientes grupos de riesgo:

- Niños inmunocompetentes, con riesgo de enfermedad neumococica o sus complicaciones debido a enfermedades cronicas cardiovasculares o respiratorias, diabetes mellitus o perdida de liquido cefalorraquideo.
- Niños inmunocomprometidos, con riesgo de enfermedad neumococica o sus complicaciones debido a asplenia anatomica o funcional, enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma, insuficiencia renal, sindrome nefrotico, anemia falciforme o trasplante de organos.
- Niños con infeccion por VIH, sintomaticos o asintomaticos.
- Aquellas situaciones que determinen las autoridades sanitarias.

Nº REG: 06366018

CN: 663162

TANDEMACT 30/2MG 28 COMPRIMIDOS

INDICACIONES: Tandemact esta indicado para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que sufren intolerancia a la metformina o en quienes la metformina esta contraindicada y que estan ya en tratamiento con una combinacion de pioglitazona y glimepirida.

Nº REG: 06366006

CN: 663163

TANDEMACT 30/4MG 28 COMPRIMIDOS

INDICACIONES: Tandemact esta indicado para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que sufren intolerancia a la metformina o en quienes la metformina esta contraindicada y que estan ya en tratamiento con una combinacion de pioglitazona y glimepirida.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 61805

CN: 665273 TAU-KIT 100MG 1 COMPRIMIDO
SOLUBLE

INDICACIONES: diagnostico in vivo de la infeccion gastroduodenal por Helicobacter Pylori

Nº REG: 117123602

CN: 719968 TRELEGY ELLIPTA 92/55/22MCG 1 INH 30 DOSIS
POLVO INHALACION (UNIDOSIS)

INDICACIONES: Tratamiento en pacientes adultos con EPOC, limitando su dispensacion, mediante visado a los pacientes que se encuentren en tratamiento con una triple terapia compuesta por CSI/LABA/LAMA, despues de haber comprobado que responden adecuadamente a los componentes por separado, es decir, en aquellos en que el tratamiento esta estabilizado y es efectivo.

Nº REG: 112807004

CN: 697408 TRESIBA 100U/ML 5 PLUMAS PRECARGADAS
DE 3ML SOLUCION INYECTABLE

INDICACIONES: Su uso se restringe al tratamiento de pacientes diabeticos tipo 1 y 2 tratados con insulinas y analogos de insulina de accion prolongada que necesitan dos inyecciones basales diarias y que se caracterizan por riesgo relativamente alto de sufrir hipoglucemias.

Nº REG: 112807013

CN: 726213 TRESIBA 200U/ML 3 PLUMAS PRECARGADAS
DE 3ML SOLUCION INYECTABLE

INDICACIONES: Su uso se restringe al tratamiento de pacientes diabeticos tipo 1 y 2 tratados con insulinas y analogos de insulina de accion prolongada que necesitan dos inyecciones basales diarias y que se caracterizan por riesgo relativamente alto de sufrir hipoglucemias.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 1171208002

CN: 718533 TRIMBOW 87/5/9MCG 120 PULSACIONES
SOLUC INHALAC ENVASE A PRESION

INDICACIONES: Tratamiento en pacientes adultos con EPOC, limitando su dispensacion, mediante visado a los pacientes que se encuentren en tratamiento con una triple terapia compuesta por CSI/LABA/LAMA, despues de haber comprobado que responden adecuadamente a los componentes por separado, es decir, en aquellos en que el tratamiento esta estabilizado y es efectivo.

Nº REG: 114956002

CN: 704633 TRULICITY 0,75MG 4 PLUMAS PRECARGADAS
SOLUCION INYECTABLE

INDICACIONES: Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en obesos con un indice de masa corporal igual o mayor de 30Kg/m2 y en terapia combinada con otros antidiabeticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucemico adecuado.

Nº REG: 114956007

CN: 704632 TRULICITY 1,5MG 4 PLUMAS PRECARGADAS
SOLUCION INYECTABLE

INDICACIONES: Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en obesos con un indice de masa corporal igual o mayor de 30Kg/m2 y en terapia combinada con otros antidiabeticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucemico adecuado.

Nº REG: 67650

CN: 654057 UBTEST100MG 1 COMPRIMIDO RECUBIERTO
CON PELICULA

INDICACIONES: Este medicamento es unicamente para uso diagnostico. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula esta indicado para el diagnostico in vivo de la infeccion gastroduodenal por Helicobacter pylori.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 84342

CN: 726352 **ULIMYO 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG**

INDICACIONES: El acetato de ulipristal esta indicado para el tratamiento preoperatorio de los sintomas moderados y graves de miomas uterinos en mujeres adultas en edad reproductiva siendo la duracion del tratamiento hasta dos ciclos de tres meses.
Tratamiento intermitente repetido de los sintomas moderados a graves de los miomas uterinos en mujeres adultas en edad fertil que no son candidatas a cirugia.

Nº REG: 83456

CN: 723677 **UXAGREL 10MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Uxagrel, co-administrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

Nº REG: 83457

CN: 723678 **UXAGREL 5MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Uxagrel, co-administrado con acido acetilsalicilico (AAS), esta indicado para la prevencion de eventos aterotromboticos en pacientes adultos con sindrome coronario agudo (p.ej. angina inestable, infarto de miocardio sin elevacion del segmento ST [AI/IMSEST] o infarto de miocardio con elevacion del segmento ST [IMEST]) sometidos a intervencion coronaria percutanea (ICP) primaria o aplazada.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71869

CN: 664682

VATOUD 75MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

INDICACIONES: Clopidogrel esta indicado en adultos para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos en:
☐ Pacientes que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
☐ Pacientes que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.(NUEVA INDICACION)

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71869

CN: 697268

**VATOUD 75MG 50 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG**

INDICACIONES: Prevencion de acontecimientos aterotromboticos
Vatoud esta indicado en:
☐ Pacientes adultos que han sufrido recientemente un infarto agudo de miocardio (desde pocos dias antes hasta un maximo de 35 dias), un infarto cerebral (desde 7 dias antes hasta un maximo de 6 meses despues) o que padecen enfermedad arterial periferica establecida.
☐ Pacientes adultos que presentan un sindrome coronario agudo:
- Sindrome coronario agudo sin elevacion del segmento ST (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin onda Q), incluyendo pacientes a los que se le ha colocado un stent despues de una intervencion coronaria percutanea, en combinacion con acido acetilsalicilico (AAS).
- Pacientes con infarto agudo de miocardio con elevacion del segmento ST, que son candidatos a terapia trombolitica, en combinacion con AAS.
Prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos en fibrilacion auricular
En pacientes adultos con fibrilacion auricular que tienen al menos un factor de riesgo para acontecimientos vasculares, que no son elegibles para el tratamiento con antagonistas de la Vitamina K (AVK) y que tienen un indice de hemorragia bajo, clopidogrel en combinacion con AAS esta indicado para la prevencion de acontecimientos aterotromboticos y tromboembolicos, incluyendo accidente cerebrovascular.

Nº REG: 1171179004

CN: 720641

**VELTASSA 16,8G 30 SOBRES POLVO PARA
SUSPENSION ORAL**

INDICACIONES: Tratamiento de la hiperpotasemia en adultos, estableciendo reservas singulares en el ambito del SNS, consistente en limitar su prescripcion y dispensacion, mediante visado para ser prescrito por especialistas en nefrologia, cardiologia y medicina interna, a pacientes con ERC avanzada e insuficiencia cardiaca grado III-IV y con hiperpotasemia leve a moderada (5,5-6,4 mmol/litro), en tratamiento con inhibidores del SRAA y en los que se considere imprescindible su continuacion, y con fracaso o intolerancia a resinas de intercambio ionico.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 1171179001

CN: 720640 VELTASSA 8,4G 30 SOBRES POLVO PARA
SUSPENSION ORAL

INDICACIONES: Tratamiento de la hiperpotasemia en adultos, estableciendo reservas singulares en el ambito del SNS, consistente en limitar su prescripcion y dispensacion, mediante visado para ser prescrito por especialistas en nefrologia, cardiologia y medicina interna, a pacientes con ERC avanzada e insuficiencia cardiaca grado III-IV y con hiperpotasemia leve a moderada (5,5-6,4 mmol/litro), en tratamiento con inhibidores del SRAA y en los que se considere imprescindible su continuacion, y con fracaso o intolerancia a resinas de intercambio ionico.

Nº REG: 34009 382 856 7 3

CN: 724879 VERSATIS 700MG 30 APOSITOS ADHESIVOS
MEDICAMENTOSOS

INDICACIONES: Alivio sintomatico del dolor neuropatico asociado a infeccion previa por herpes zoster (neuralgia posherpetica, NPH) en adultos.

Nº REG: 34009 382 856 7 3

CN: 724878 VERSATIS 700MG 20 APOSITOS ADHESIVOS
MEDICAMENTOSOS

INDICACIONES: Alivio sintomatico del dolor neuropatico asociado a infeccion previa por herpes zoster (neuralgia posherpetica, NPH) en adultos.

Nº REG: 71848

CN: 700726 VERSATIS 700MG 30 APOSITOS ADHESIVOS
MEDICAMENTOSOS

INDICACIONES: Alivio sintomatico del dolor neuropatico asociado a infeccion previa por herpes zoster (neuralgia posherpetica, NPH) en adultos.

Nº REG: 71848

CN: 700727 VERSATIS 700MG 20 APOSITOS ADHESIVOS
MEDICAMENTOSOS

INDICACIONES: Alivio sintomatico del dolor neuropatico asociado a infeccion previa por herpes zoster (neuralgia posherpetica, NPH) en adultos.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 09529002

CN: 662979

**VICTOZA 6MG/ML 2 PLUMAS PRECAR 3ML
SOLUCION INYECTABLE**

INDICACIONES: Pacientes con sobrepeso con indice de masa corporal igual o mayor a 30 kg/m² que reunan las indicaciones terapeuticas autorizadas del tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 para alcanzar el control glucemico en combinacion con medicamentos hipoglucemiantes orales y/o insulina basal cuando estos, junto con dieta y ejercicio, no logran un control glucemico adecuado (ver secciones 4.4 y 5.1 para consultar los datos disponibles sobre las diferentes combinaciones).

Nº REG: 78357

CN: 701120

VIRIREC 3MG/G 4 APLICADORES CREMA

INDICACIONES: Tratamiento de hombres mayor o igual a 18 años de edad con disfuncion erectil, con incapacidad para obtener o mantener una ereccion adecuada para una actividad sexual satisfactoria.

Nº REG: 114918011

CN: 703171

**VOKANAMET 150/1000MG 60 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Tratamiento de aquellos pacientes diabeticos que con la dosis de 50mg/850mg o 50mg/1000mg de canagliflozina/metformina no alcanzan el control glucemico.

Nº REG: 114918008

CN: 703172

**VOKANAMET 150/850MG 60 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Tratamiento de aquellos pacientes diabeticos que con la dosis de 50mg/850mg o 50mg/1000mg de canagliflozina/metformina no alcanzan el control glucemico.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 08472006

CN: 654732 **XARELTO 10MG 10 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugia electiva de reemplazo de cadera o rodilla.

Nº REG: 08472007

CN: 654750 **XARELTO 10MG 30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion del tromboembolismo venoso en pacientes adultos sometidos a cirugia electiva de reemplazo de cadera o rodilla

Nº REG: 08472012

CN: 686887 **XARELTO 15MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion del ictus y de la embolia sistemica en pacientes adultos con fibrilacion auricular (FA) no valvular, con uno o mas factores de riesgo, como por ejemplo, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertension, edad mayor o igual de 75 años, diabetes mellitus, ictus o ataque isquemico transitorio previos.

Nº REG: 08472018

CN: 686894 **XARELTO 20MG 28 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Prevencion del ictus y de la embolia sistemica en pacientes adultos con fibrilacion auricular (FA) no valvular, con uno o mas factores de riesgo, como por ejemplo, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertension, edad mayor o igual de 75 años, diabetes mellitus, ictus o ataque isquemico transitorio previos.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON CUPON PRECINTO DIFERENCIADO CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 58603

CN: 685719

**ZOLADEX 3,6MG/JER 1 IMPLANTE JERINGA
PREC**

INDICACIONES:

- carcinoma de prostata avanzado, cuando el tratamiento hormonal esta indicado.
- cancer de mama en pacientes pre y perimenopausicas, en las que el tratamiento hormonal es apropiado.
- endometriosis
- fibromas uterinos
- disminucion del grosor del endometrio antes de la ablacion del mismo para esta indicacion, se deberan administrar dos depots de Zoladex 3,6 con un intervalo de cuatro semanas, estando planificada la intervencion quirurgica entre la semana cero y la segunda despues del ultimo depot inyectado.
- reproduccion asistida: supresion del control hipofisario en la preparacion para la superovulacion.

Nº REG: 1151080003

CN: 710444

**ZURAMPIC 200MG 30 COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA**

INDICACIONES: Financiacion restringida a su uso:en combinacion con un inhibidor de la xantina oxidasa, esta indicado en adultos para el tratamiento de la hiperuricemia en pacientes con una afeccion sintomatica relevante y cuya hiperuricemia no ha respondido adecuadamente con alopurinol o febuxostat a dosis maximas toleradas, restringiendose su uso combinado con febuxostat unicamente cuando se haya utilizado previamente en combinacion con alopurinol o cuando este este contraindicado.
