

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 75908

CN: 654779

CLOZABRAIN 50MG 40 COMPRIMIDOS BLISTER

INDICACIONES: Clozabrain esta indicado en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo los antipsicoticos atipicos. La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado. Clozabrain esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

Nº REG: 83670

CN: 724290

CLOZAPINA AUROVITAS 100MG 40 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: -Tratamiento de la esquizofrenia resistente: en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo antipsicoticos atipicos. La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado dosis adecuadas de como minimo dos agentes antipsicoticos diferentes, incluyendo un antipsicotico atipico, prescritos durante el tiempo adecuado. -Psicosis durante el curso de la enfermedad de Parkinson: trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83669

CN: 724289

CLOZAPINA AUROVITAS 200MG 40 COMPRIMIDOS

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente:
Clozapina Aurovitas esta indicado en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo antipsicoticos atipicos. La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado dosis adecuadas de como minimo dos agentes antipsicoticos diferentes, incluyendo un antipsicotico atipico, prescritos durante el tiempo adecuado.

Nº REG: 59547

CN: 697422

LEPONEX 100MG 40 COMPRIMIDOS (PVC/PE/PVDC)

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente:
Leponex esta indicado en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico. La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado.
Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson:
Leponex esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 59548

CN: 697423

LEPONEX 25MG 40 COMPRIMIDOS (PVC/PE/PVDC)

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente:
Leponex esta indicado en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico.
La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado.
Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson:
Leponex esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

Nº REG: 83968

CN: 725199

NEMEA 100MG 40 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente
Clozapina esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo los antipsicotico atipicos.
La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado.
Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson
Clozapina esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71566

CN: 670753

NEMEA 100MG 40 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Nemea esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo los antipsicoticos atipicos. La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado. Nemea esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

Nº REG: 75901

CN: 689838

NEMEA 200MG 40 COMPRIMIDOS (BLISTER)

INDICACIONES: Nemea esta indicado en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo los antipsicoticos atipicos. La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado. Nemea esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 83969

CN: 725201

NEMEA 200MG 40 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente
Clozapina esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo los antipsicotico atipicos.
La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado.
Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson
Clozapina esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

Nº REG: 83970

CN: 725202

NEMEA 25MG 40 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG

INDICACIONES: Tratamiento de la esquizofrenia resistente
Clozapina esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo los antipsicotico atipicos.
La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado.
Tratamiento en el curso de la enfermedad de Parkinson
Clozapina esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

RELACION DE MEDICAMENTOS CON VISADO (ANTES DE ESPECIAL CONTROL MEDICO) CON SUS INDICACIONES

Nº REG: 71546

CN: 670750

NEMEA 25MG 40 COMPRIMIDOS EFG

INDICACIONES: Nemea esta indicada en pacientes esquizofrenicos resistentes a tratamiento y en pacientes esquizofrenicos que presenten reacciones adversas neurologicas graves y no tratables con otros farmacos antipsicoticos, incluyendo los antipsicoticos atipicos. La resistencia al tratamiento se define como la ausencia de mejoría clinica satisfactoria a pesar de haber utilizado como minimo dos tratamientos diferentes con antipsicoticos, incluyendo un antipsicotico atipico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado. Nemea esta tambien indicado en trastornos psicoticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en los que haya fallado el tratamiento estandar.

Nº REG: 56204

CN: 700574

URONEFREX 125MG 50 CAPSULAS

INDICACIONES: Exclusivamente urolitiasis provocadas por infecciones urinarias por germen productores de ureasa (Proteus, Kebsiella, Pseudomonas) especialmente cuando hayan fracasado otras terapeuticas.

Nº REG: 56203

CN: 700577

URONEFREX 250MG 50 CAPSULAS

INDICACIONES: Exclusivamente urolitiasis provocadas por infecciones urinarias por germen productores de ureasa (Proteus, Kebsiella, Pseudomonas) especialmente cuando hayan fracasado otras terapeuticas.